

SEMANA 21 AÑO 2026

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER

DIRECCIÓN DE SALUD INTEGRAL

GRUPO DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFÍA

1. COMPORTAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN

Para esta semana, las Unidades Notificadoras Municipales (UNM), registraron un índice de notificación del **100%**, cumpliendo satisfactoriamente con la totalidad de las notificaciones previstas, asegurando la gestión integral de la información.

1.1. Indicadores de Oportunidad

✓ Notificación UNM

Durante la semana epidemiológica **21**, se alcanzó **100%** de cumplimiento en la notificación.

Este resultado refleja la adherencia total a los lineamientos nacionales por parte de los **87 municipios**, cuya gestión garantizó una oportunidad del **100%**.

✓ Notificación UPGD

Las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) demostraron un desempeño sobresaliente en la semana **21**, alcanzando una oportunidad de notificación del 100% (253/253). Este indicador de cumplimiento total, supera ampliamente los estándares definidos en los lineamientos nacionales para el año **2026**. El balance acumulado de las UPGD hasta la fecha refleja un cumplimiento total (**253/253**).


Este indicador del **100%** no solo cumple, sino que supera lo establecido en los lineamientos nacionales.

✓ Oportunidad en la notificación por evento

a oportunidad acumulada en la notificación de eventos de interés en salud pública muestra una tendencia favorable entre **2025** y **2026**, evidenciando mejoras tanto en la notificación semanal como en la inmediata. Para la notificación semanal, se observa un cumplimiento del **95%**, en **2025**, incrementando a **96%** en **2026**, lo que representa una variación de **0.87** puntos porcentuales. Este comportamiento refleja un adecuado desempeño del sistema de vigilancia en el reporte dentro de los tiempos establecidos.

En relación con la notificación inmediata, el indicador pasa de **74%** en **2025** a **84% 2026**, con un aumento de **9.29** puntos porcentuales. A pesar de esta mejora, el cumplimiento continúa por debajo de los niveles esperados, lo que evidencia oportunidades de fortalecimiento en la detección y reporte oportuno de eventos que requieren intervención inmediata.

Oportunidad en la notificación de eventos de interés en Salud Publica S.E 21 de 2026.



Fuente de los datos: SIVIGILA

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	3 de 105

Se identifican municipios en color rojo que **no cumplieron con la realización de los ajustes requeridos (100% de incumplimiento)**, lo que refleja fallas críticas en la depuración y actualización de la información epidemiológica. Esta situación es relevante, ya que la ausencia

De acuerdo con el comportamiento histórico del evento, para la SE 21 de 2026 la notificación de parotiditis se encuentra dentro de lo esperado para el periodo evaluado, con fluctuaciones entre semanas y sin evidenciar una tendencia sostenida.

La incidencia de parotiditis en la población general del departamento de Santander, con corte a la semana epidemiológica 21 de 2026, es de 1,62 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En la población menor de cinco años del departamento, la incidencia de parotiditis es de 3,98 casos por cada 100.000 menores de cinco años.

Casos de parotiditis notificados, según entidad territorial de procedencia, Santander.
SE 01-21, 2026.

Municipio	Casos	%	Incidencia Pob. General
Bucaramanga	20	51,28%	3,23
Floridablanca	5	12,82%	1,59
Barrancabermeja	4	10,26%	1,73
Piedecuesta	4	10,26%	2,07
Giron	2	5,13%	1,13
Barbosa	1	2,56%	2,92
Florian	1	2,56%	17,55
Malaga	1	2,56%	4,10
Puerto Wilches	1	2,56%	2,74
SANTANDER	39	1	1,62

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

Según la entidad territorial de procedencia, a la semana epidemiológica 21 de 2026 se notificaron 39 casos de parotiditis en Santander. Bucaramanga concentró el mayor número de casos (n=20; 51,28 %), seguido de Floridablanca (n=5; 12,82 %), Barrancabermeja y Piedecuesta (n=4; 10,26 % cada uno), y Girón (n=2; 5,13 %). Los municipios de Barbosa, Florián, Málaga y Puerto Wilches registraron un caso cada uno (2,56 %).

Distribución sociodemográfica de los casos de Parotiditis, Santander, SE 01 – 21, 2026

Variables	N° casos	%
Sexo	Femenino	22 56,41%
	Masculino	17 43,59%
Área	Cabecera m/pal	36 92,31%
	Rural Disperso	3 7,69%
Condición Final	Vivo	39 100,00%
Tipo SS	Subsidiado	22 56,41%
	Contributivo	8 20,51%
	Excepcion	8 20,51%
	Especial	1 2,56%
Rango de edad	< 1 año	0 0,00%
	1-4	6 15,38%
	5-9	7 17,95%
	10-14	5 12,82%
	15-19	0 0,00%
	20-29	3 7,69%
	30-39	5 12,82%
	40-49	3 7,69%
	50-59	6 15,38%
	60-69	0 0,00%
Total	70 y mas	4 10,26%
		39 100%

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

En cuanto a las características sociodemográficas de los casos, predominó el sexo femenino (56,41 %; n=22), con mayor frecuencia de casos en cabecera municipal (92,31 %; n=36). Todos los casos presentaron condición final vivo. Por tipo de aseguramiento predominó el régimen subsidiado (56,41 %; n=22), seguido de los regímenes contributivo y de excepción

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	10 de 105

Al corte, Santander registra siete casos sospechosos, procedentes de Bucaramanga (n=2) y de Floridablanca, San Gil, Girón, Matanza y Simacota (n=1 cada uno); los 23 casos restantes han sido descartados.

Tasa de notificación de casos sospechosos de Sarampión/Rubéola. Santander, SE 01-21, 2026

Municipio	Población	Tasa notificación
Bucaramanga	618.548	1,46
Floridablanca	315.194	1,59
San Gil	71.064	5,63
Giron	177.523	1,69
Barrancabermeja	230.559	0,87
Barichara	13.156	7,60
Cimitarra	33.807	2,96
Curiti	14.751	6,78
Los Santos	17.263	5,79
Matanza	5.727	17,46
Piedecuesta	192.888	0,52
Simacota	11.756	8,51
SANTANDER	2.410.700	1,24

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

Alerta

En la SE 08 de 2026 se confirmó un caso importado de sarampión en un residente de Bucaramanga con antecedente de viaje internacional a Ciudad de México durante el periodo de incubación. El caso fue confirmado por laboratorio (IgM positiva y PCR genotipo D8) y clasificado por el Instituto Nacional de Salud como importado.

Tras las acciones de investigación epidemiológica y seguimiento de contactos, el cerco epidemiológico se cerró sin identificar casos secundarios y el seguimiento finalizó el 15 de mayo de 2026. A la fecha, no se evidencia transmisión local asociada al caso, por lo que la alerta se considera cerrada.

A corte de la SE 21 de 2026, se notificaron tres casos procedentes del exterior en residentes de Santander, incluido el caso importado confirmado descrito anteriormente; los dos casos restantes fueron descartados.

2.1.6 Síndrome de Rubéola Congénita

A semana epidemiológica (SE) número 21 de 2026, no se notificaron casos al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). En el año 2025, con corte a SE 21 se notificó un caso, el cual fue descartado.

2.1.7 Tétanos Accidental

A semana epidemiológica (SE) número 21 de 2026, no se notificaron casos al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) con procedencia en el departamento. En el año 2025, con corte a SE 21 no se notificaron casos.

2.1.8 Tétanos Neonatal

A semana epidemiológica (SE) número 21 de 2026, no se notificaron casos al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) procedentes en Santander. En el año 2025, con corte a SE 21 no se notificaron casos.

2.1.9 Tos Ferina

A semana epidemiológica (SE) número 21 de 2026, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 135 casos probables de Tos ferina, procedentes del



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	14 de 105

Variables		Confirmados		Probable		Total	
		n°	%	n°	%	n°	%
Indeterminado		0	-	0	-	0	-
Rango de edad	< 1 año	11	33,3%	2	22,2%	13	31,0%
	1-4	10	30,3%	6	66,7%	16	38,1%
	5-9	5	15,2%	1	11,1%	6	14,3%
	10-17	2	6,1%	0	-	2	4,8%
	18-29	3	9,1%	0	-	3	7,1%
	30-49	1	3,0%	0	-	1	2,4%
	50-59	0	-	0	-	0	-
	60 y mas	1	3,0%	0	-	1	2,4%
Total		33		10		43	

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

La distribución sociodemográfica de los casos confirmados y probables de tos ferina en Santander mostró predominio del sexo masculino (61,0 %; n=25). Según área de residencia, el 63,4 % (n=26) correspondió a zona rural dispersa y el 36,6 % (n=15) a cabecera municipal. El 95,1 % (n=39) de los casos presentó condición final vivo y se registraron dos defunciones (4,9 %). Por tipo de afiliación predominó el régimen subsidiado (78,0 %; n=32), seguido del contributivo (21,5 %; n=8). Por grupos de edad, la mayor concentración se presentó entre 1 y 4 años (39,0 %; n=16), seguido de menores de 1 año (29,3 %; n=12) y de 5 a 9 años (12,2 %; n=5).

Brote en población indígena

El 27 de enero de 2026 se activó alerta por brote de tos ferina en población indígena de los municipios de Concepción y El Cerrito. Con corte a la SE 21, se han notificado 135 casos en el departamento, de los cuales el 58% (78) corresponden a población indígena, procedentes exclusivamente de estos dos municipios. En este grupo, el 26% (20) son casos confirmados, el 9% (7) continúan en estudio y el 64% descartados (49).

Clasificación de casos de Tos Ferina, Población Indígena, según entidad de procedencia, Santander, 2026²

Clasificación	Cerrito		Concepcion		Total	
	n	%	n	%	n	%
Probable	4	6,90	3	15,00	7	8,97
Confirmado	15	25,86	5	25,00	20	25,64
Descartado	39	67,24	10	50,00	49	62,82
Descartado por error de digitación	0	0,00	2	10,00	2	2,56
Total, de casos notificados	58	74%	20	26%	78	100

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

Desde el punto de vista sociodemográfico, los casos de tos ferina en los municipios de Concepción y Cerrito se concentraron principalmente en población residente de zona rural dispersa (98,7 %; n=75), afiliada al régimen subsidiado (97,4 %; n=74), con predominio del sexo femenino (52,6 %; n=40). Los grupos de edad más afectados correspondieron a niños de 1 a 4 años (35,5 %; n=27), seguidos por los de 5 a 9 años (22,4 %; n=17) y los menores de 1 año (17,1 %; n=13).

Entre los casos confirmados, el 95,0 % (n=19) residía en zona rural dispersa y estaba afiliado al régimen subsidiado. Se registraron dos defunciones entre los casos confirmados (10,0 %; n=2), mientras que el 90,0 % (n=18) presentó condición final vivo. Los grupos de edad con mayor proporción de casos confirmados fueron los de 1 a 4 años (45,0 %; n=9), seguidos por los menores de 1 año (25,0 %; n=5) y los de 5 a 9 años (15,0 %; n=3).

Distribución sociodemográfica de los casos de Tosferina, Concepción y Cerrito, Santander, Brote, 2026

Variables		Confirmados		Probable		Descartados		Total	
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Sexo	Femenino	10	50,0%	3	42,9%	27	55,1%	40	52,6%
	Masculino	10	50,0%	4	57,1%	22	44,9%	36	47,4%
Área	Cabecera m/pal	1	5,0%	0	-	0	-	1	1,3%

² La información es preliminar puede presentar variaciones semanales debido a notificaciones tardías, hallazgos de la investigación epidemiológica de campo, ajustes en la clasificación y procesos de depuración por calidad del dato, propias del proceso de seguimiento al evento.

República de Colombia



GOBIERNO DE SANTANDER

Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	16 de 105

Según la entidad territorial de procedencia, Bucaramanga concentró el mayor número de casos confirmados de varicela (40,32 %; n=200), seguida de Floridablanca (13,31 %; n=66), Girón (7,66 %; n=38), Barrancabermeja (7,06 %; n=35) y Piedecuesta (6,25 %; n=31). La mayor incidencia se registró en Puerto Wilches (38,33 casos por 100.000 habitantes), seguido de Bucaramanga (32,33) y Socorro (32,30).

Casos confirmados de Varicela notificados, según entidad territorial de procedencia, Santander. SE 01-21, 2026.

Municipio	Casos	%	Incidencia
Bucaramanga	200	40,32%	32,33
Floridablanca	66	13,31%	20,94
Giron	38	7,66%	21,41
Barrancabermeja	35	7,06%	15,18
Piedecuesta	31	6,25%	16,07
Puerto Wilches	14	2,82%	38,33
San Gil	14	2,82%	19,70
Socorro	12	2,42%	32,30
Lebrija	9	1,81%	17,27
Barbosa	6	1,21%	17,52
Otros municipios	71	14,31%	0,04
Santander	496	100%	20.57

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

La distribución sociodemográfica de los casos de varicela en Santander evidenció predominio del sexo masculino (53,43 %; n=265), mientras que el femenino representó el 46,57 % (n=231). La mayoría de los casos se ubicó en cabecera municipal (84,88 %; n=421), seguida de la zona rural dispersa (11,29 %; n=56) y los centros poblados (3,83 %; n=19). No se registraron defunciones por esta causa durante el periodo analizado.


Por tipo de aseguramiento predominó el régimen contributivo (58,47 %; n=290), seguido del subsidiado (31,65 %; n=157) y el de excepción (8,06 %; n=40). Según grupo de edad, la mayor proporción de casos se presentó en personas de 10 a 17 años (30,44 %; n=151), seguido del grupo de 18 a 29 años (26,01 %; n=129) y de 1 a 4 años (13,51 %; n=67).

Distribución sociodemográfica de los casos de Varicela, Santander, SE 01 – 21, 2026

Variables		N° casos	%
Sexo	Masculino	265	53,43%
	Femenino	231	46,57%
Área	Cabecera m/pal	421	84,88%
	Rural Disperso	56	11,29%
	Centro Poblado	19	3,83%
Condición Final	Vivo	496	100,00%
Tipo SS	Contributivo	290	58,47%
	Subsidiado	157	31,65%
	Excepcion	40	8,06%
	Especial	4	0,81%
	Indeterminado	3	0,60%
	No asegurado	2	0,40%
Rango de edad	< 1 año	15	3,02%
	1-4	67	13,51%
	5-9	35	7,06%
	10-17	151	30,44%
	18-29	129	26,01%
	30-49	68	13,71%
	50-59	14	2,82%
	60 y mas	17	3,43%
Total	496	100%	

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026


Casos Leptospirosis, Santander, Semanas epidemiológicas 01- 21, 2025-2026



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

Los municipios con mayor incidencia de casos probables de leptospirosis según procedencia son: Vélez, Jesús María, Albania, Guadalupe, La paz, Puente Nacional, Paramo, Matanza, Los Santos, Capitanejo, Tona, Rionegro, La incidencia de los casos Confirmados de Leptospira para Santander es 5.77 casos/100.000 habitantes.

Incidencia de Leptospirosis por municipio de procedencia. Santander, semanas epidemiológicas 01- 21, 2026



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

República de Colombia



Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	22 de 105

El 69.29% de los casos de Leptospirosis se presentaron en el sexo masculino, con una incidencia de 8.20% casos por cada 100.000 hombres; el 78.57% se presentaron en área urbana con una incidencia de 19.84 casos por cada 100.000 habitantes en área urbana; y el 37.14% pertenecen al régimen contributivo con una incidencia de 4.69 por cada 100.000 habitantes del régimen contributivo.


Comportamiento Demográfico y social de los casos de Leptospirosis, Santander, semanas epidemiológicas 01- 21, 2025

Variables	Nº casos	%	Incidencia
Masculino	97	69,29%	8,20
Femenino	43	30,71%	3,50
Urbano	110	78,57%	19,84
Rural	30	21,43%	0,16
Vivo	138	98,57%	5,72
Muerto	2	1,43%	0,00
Contributivo	52	37,14%	4,69
Excepcion	43	30,71%	3,71
Excepcion / Especial	43	30,71%	59,01
Indeterminado	2	1,43%	NA
Especial	0	0,00%	NA
	140	100%	

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

El 23.57% de los casos se presentaron en el rango de edad de 20 a 29 años de ambos sexos.

Casos de Leptospirosis por rango de Edad y Sexo, Santander, semanas epidemiológicas 01-21 2025



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

Indicadores de Leptospirosis

Tipo de Indicador	Valor
Proporción de casos de leptospirosis según clasificación. Caso confirmado por laboratorio o por nexo / caso sospechoso	2.86%
Letalidad por leptospirosis / casos confirmados	0%

dispersa con una incidencia de 12.81 casos por cada 100.000 habitantes del área rural y el 63.86% pertenecen al régimen subsidiado. A semana epidemiológica 21 no se han presentado casos de mortalidad por accidente ofídico.


Comportamiento demográfico y social de los casos de accidente ofídico, Santander, Semanas Epidemiológicas 01- 21. 2026

	Variables	N° casos	%	Incidencias
Sexo	Masculino	57	68,67%	4,82
	Femenino	26	31,33%	2,12
Área	Rural	71	85,54%	12,81
	Urbano	12	14,46%	0,65
Condición Final	Vivo	83	100,00%	3,44
	Muerto	0	0,00%	0,00
Tipo SS	Subsidiado	53	63,86%	4,78
	Contributivo	22	26,51%	1,90
	Excepción - Especial	6	7,23%	0,82
	Excepcion	2	2,41%	SD
	Especial	0	0,00%	SD
Total		83	100%	

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

Los grupos de edad más afectados son los de 30 a 39 con el 17.14% para ambos sexos, para el sexo femenino el grupo de edad con más reporte son los de 10-14 años con 21.1% y en el sexo masculino as edades de 40-49 años con un 17.65%


Casos de Accidente Ofídico por Rango de Edad y Sexo, Santander, Semanas epidemiológicas 01- 21, 2026



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

Los tipos de serpientes que ocasionaron mayor proporción de casos de accidente ofídico son Equis 30.1%, mapaná con el 10.8%.


Canal endémico de los Servicios de Consulta externa y urgencias para el Evento de IRA, Santander SE 21 año 2026



Desde el análisis epidemiológico, este patrón sugiere una circulación importante de eventos respiratorios en diferentes provincias del departamento, posiblemente asociada a factores estacionales, aumento de circulación viral, condiciones climáticas, concentración poblacional o incremento en la demanda de servicios de salud por enfermedades respiratorias. Se identifica que varias zonas del departamento presentan municipios con comportamiento inusual de manera agrupada, lo cual podría indicar, transmisión simultánea en áreas vecinas, comportamientos epidemiológicos regionales, o aumento de consultas respiratorias en corredores poblacionales específicos.

Asimismo, algunos municipios aparecen en color gris, indicando comportamiento dentro de lo esperado o ausencia de incremento significativo frente al canal endémico. Esto evidencia heterogeneidad territorial en el comportamiento de la IRA dentro del departamento.

Mapa de comportamiento Inusual de la IRA en población del departamento de Santander.




Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

La positividad de virus respiratorios en Santander para el año 2026 hasta la semana epidemiológica 10 muestra un patrón de circulación viral con predominio sostenido de

rinovirus, el cual mantiene la mayor proporción en la mayoría de las semanas. Se evidencia un incremento progresivo de influenza A (H3N2) y del virus sincitial respiratorio (VSR) hacia las semanas recientes (7–10), sugiriendo el inicio de un periodo de mayor intensidad de transmisión respiratoria. Otros virus como parainfluenza, coronavirus, adenovirus y metapneumovirus presentan participación variable y menor proporción, sin predominio claro. La circulación de influenza no subtipificada y otros linajes indica persistencia de diversidad viral. En conjunto, el comportamiento corresponde a un escenario de transición hacia un pico respiratorio, lo que exige fortalecer la vigilancia, la confirmación diagnóstica y las medidas de prevención, especialmente en población de riesgo.

Positividad por tipo de virus según semana epidemiológica, Santander años 2026



Fuente: Laboratorio de Salud Pública de Santander, datos suministrados por instituciones con implementación de panel viral respiratorio FilmArray.

2.4 Enfermedades Transmitidas Por Vectores

2.4.1 Arbovirosis

2.4.1.1 Dengue y Dengue Grave

Hasta la semana epidemiológica 21 del año 2026, se notificaron al SIVIGILA **3.058** casos de Dengue. Los casos de dengue sin signos de alarma corresponden al 63,3%, dengue con signos de alarma el 36,1%, y el 0,6% de los casos registraron formas graves. Según las características sociodemográficas el 53,0% de los casos se presentaron en el sexo masculino; el 86,1% ocurrieron en área cabecera municipal y el 55,9% registraron régimen de seguridad social contributivo.

Características sociodemográficas Dengue, Dengue Grave. Santander, S.E. 1-21, 2026

	Variables	Dengue	Dengue Grave	Total	%	Proporción Incidencia
Sexo	Masculino	1611	9	1620	53,0%	136,88
	Femenino	1429	9	1438	47,0%	117,18
Área	Cabecera m/pal	2616	17	2633	86,1%	141,84
	Rural Disperso	424	1	425	13,9%	76,65
Tipo SS	Contributivo	1700	9	1709	55,9%	154,11
	Subsidiado	1089	7	1096	35,8%	94,64
	Excepción	199	2	201	6,6%	275,85
	Especial	19	0	19	0,6%	SD
	Indeterminado	18	0	18	0,6%	SD
	No asegurado	15	0	15	0,5%	SD
Total		3040	18	3058	100%	

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Los municipios con mayor aporte en el número de casos de dengue fueron: Bucaramanga (34,3%), Floridablanca (12,8%), Barrancabermeja (11,7%), Girón (8,0%), y Piedecuesta (5,4%). Los municipios con mayor incidencia fueron: Chipatá 438,3 (estable), Sábana de Torres 375,0 (incremento), San Vicente de Chucurí 370,4 (incremento), y Aratoca 305,3 (estable) casos por 100 000 habitantes en población a riesgo. El departamento registra una incidencia de **126,9 casos por 100 000 habitantes.**

Dengue y Dengue Grave por municipio de procedencia. Santander, S.E. 1-21, 2026								
Municipio	Sin signos de alarma	Con signos de alarma			Dengue Grave	Total	%	Incidencia
		Probable	Conf. Lab.	Conf. Nexo				
Bucaramanga	685	46	312	1	5	1049	34,3%	169,6
Floridablanca	259	9	121	0	3	392	12,8%	124,4
Barrancabermeja	185	7	165	0	2	359	11,7%	155,7
Giron	166	7	69	0	2	244	8,0%	137,4
Piedecuesta	119	17	28	0	0	164	5,4%	85,0
Sabana de Torres	95	24	23	0	2	144	4,7%	375,0
San Vicente de Chucuri	66	5	61	0	1	133	4,3%	370,4
Barbosa	56	3	15	0	0	74	2,4%	216,1
Lebrija	25	2	15	0	0	42	1,4%	80,6
Cimitarra	9	6	25	0	0	40	1,3%	118,3
El Playón	15	5	20	0	1	41	1,3%	268,1
Puerto Wilches	23	0	13	0	0	36	1,2%	98,6
San Gil	28	2	3	0	0	33	1,1%	46,4
Velez	24	1	7	0	0	32	1,0%	117,3
El Carmen de Chucuri	17	3	10	0	0	30	1,0%	120,7

Municipio	Sin signos de alarma	Con signos de alarma			Dengue Grave	Total	%	Incidencia
		Probable	Conf. Lab.	Conf. Nexo				
Aratoca	7	0	20	0	0	27	0,9%	305,3
Chipatá	11	2	10	0	0	23	0,8%	438,3
Zapatoca	14	3	1	0	0	18	0,6%	174,7
Suaita	15	0	1	0	0	16	0,5%	155,5
Rionegro	6	2	6	0	1	15	0,5%	55,8
Charalá	12	0	1	0	0	13	0,4%	93,4
Landazuri	5	1	7	0	0	13	0,4%	122,3
Socorro	7	0	4	0	1	12	0,4%	32,3
Los Santos	11	0	1	0	0	12	0,4%	69,5
Mogotes	6	0	1	0	0	7	0,2%	62,6
Oiba	6	0	0	0	0	6	0,2%	51,6
Bolivar	3	1	1	0	0	5	0,2%	43,2
La Belleza	4	0	1	0	0	5	0,2%	78,8
Puerto Parra	3	1	1	0	0	5	0,2%	54,6
Barichara	3	0	1	0	0	4	0,1%	30,4
Villanueva	5	0	0	0	0	5	0,2%	54,3
Betulia	3	0	1	0	0	4	0,1%	58,1
Concepcion	3	1	0	0	0	4	0,1%	65,5
Curití	3	0	1	0	0	4	0,1%	27,1
Malaga	4	0	0	0	0	4	0,1%	16,4



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	30 de 105

Municipio	Sin signos de alarma	Con signos de alarma			Dengue Grave	Total	%	Incidencia
		Probable	Conf. Lab.	Conf. Nexo				
Florian	3	0	0	0	0	3	0,1%	52,6
Puente Nacional	1	1	1	0	0	3	0,1%	19,5
San Andrés	1	0	2	0	0	3	0,1%	34,2
Santa Helena del Opón	3	0	0	0	0	3	0,1%	86,3
Capitanejo	1	0	1	0	0	2	0,1%	31,6
Gambita	2	0	0	0	0	2	0,1%	48,5
Galan	2	0	0	0	0	2	0,1%	65,3
Guapota	2	0	0	0	0	2	0,1%	75,0
La Paz	2	0	0	0	0	2	0,1%	39,4
Paramo	1	1	0	0	0	2	0,1%	35,3
Valle de San José	2	0	0	0	0	2	0,1%	27,8
Albania	0	1	0	0	0	1	0,0%	23,6
California	1	0	0	0	0	1	0,0%	39,4
Charta	0	0	1	0	0	1	0,0%	30,1
Confines	1	0	0	0	0	1	0,0%	26,9
Contratación	0	0	1	0	0	1	0,0%	23,5
El Guacamayo	1	0	0	0	0	1	0,0%	45,1
El Peñón	0	1	0	0	0	1	0,0%	18,8
Guadalupe	1	0	0	0	0	1	0,0%	21,6
Guavatá	1	0	0	0	0	1	0,0%	23,17

Municipio	Sin signos de alarma	Con signos de alarma			Dengue Grave	Total	%	Incidencia
		Probable	Conf. Lab.	Conf. Nexo				
Matanza	1	0	0	0	0	1	0,0%	17,46
Ocamonte	1	0	0	0	0	1	0,0%	15,08
San Benito	1	0	0	0	0	1	0,0%	32,99
San Jose de Miranda	1	0	0	0	0	1	0,0%	22,54
Simacota	1	0	0	0	0	1	0,0%	8,51
Sucre	1	0	0	0	0	1	0,0%	13,56
Surata	0	0	1	0	0	1	0,0%	21,92
Tona	1	0	0	0	0	1	0,0%	11,73
Santander	1935	152	952	1	18	3058	100%	126,9

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

El análisis de los indicadores de confirmación y hospitalización a semana 21 según el municipio de notificación de los casos de dengue con signos de alarma y dengue grave para Santander registra, que sólo el 86,9% de los casos con signos de alarma y el 96,0% de los casos de dengue grave han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio o nexos epidemiológicos. Para el indicador de hospitalización el 83,7% de los casos con signos de alarma y el 100,0% de los casos de dengue grave se han hospitalizado.

República de Colombia



Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	31 de 105

Porcentaje de confirmación-hospitalización, municipio de notificación. Santander, S.E.1-21, 2026

Municipio Notificador	Casos (n)		Confirmación (%)		Hospitalización (%)	
	Con signos de alarma	Grave	Con signos de alarma	Grave	Con signos de alarma	Grave
Bucaramanga	544	16	86,9%	93,8%	87,7%	100,0%
Barrancabermeja	190	2	95,8%	100,0%	97,4%	100,0%
Piedecuesta	100	1	83,0%	100,0%	74,0%	100,0%
Floridablanca	134	6	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
San Vicente de Chucuri	26	0	96,2%		26,9%	
Velez	26	0	84,6%		92,3%	
Puerto Wilches	8	0	100,0%		75,0%	
Sabana de Torres	38	0	36,8%		10,5%	
San Gil	21	0	90,5%		100,0%	
Giron	9	0	77,8%		11,1%	
Cimitarra	21	0	61,9%		85,7%	
El Playón	7	0	71,4%		71,4%	
El Peñón	2	0	0,0%		0,0%	
Aratoca	4	0	100,0%		0,0%	
Landazuri	1	0	100,0%		0,0%	
Puente Nacional	1	0	100,0%		0,0%	
Paramo	1	0	0,0%		100,0%	
Concepcion	1	0	0,0%		0,0%	

Municipio Notificador	Casos (n)		Confirmación (%)		Hospitalización (%)	
	Con signos de alarma	Grave	Con signos de alarma	Grave	Con signos de alarma	Grave
Zapatoca	1	0	0,0%		0,0%	
Rionegro	1	0	0,0%		100,0%	
El Carmen de Chucuri	7	0	57,1%		14,3%	
Lebrija	4	0	75,0%		25,0%	
Socorro	5	0	100,0%		100,0%	
Chipatá	2	0	0,0%		0,0%	
Betulia	1	0	100,0%		100,0%	
Contratación	1	0	100,0%		100,0%	
Santander	1156	25	86,9%	96,0%	83,7%	100,0%

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

2.4.1.2 Mortalidad por Dengue

A semana epidemiológica 21, se ha notificado nueve (9) mortalidad probable por Dengue, procedente del municipio de Bucaramanga (2), Girón (2), Cimitarra (1), Encino (1), Piedecuesta (2) y Rionegro (1). Los casos confirmados son uno (1) del municipio de Girón (1). Los casos descartados son cinco (5), de los municipios de Cimitarra (1), Encino (1), Girón (1), Piedecuesta (1) y Bucaramanga (1). Los casos restantes procedente de Rionegro (1), Piedecuesta (1) y Bucaramanga (1) se encuentran en estudio.

2.4.1.3 Chikungunya

Hasta semana epidemiológica 21, se han notificado al SIVIGILA un (1) caso sospechoso de Chikunguña procedente del municipio de Floridablanca.

2.4.1.4 Zika

Hasta la semana epidemiológica 21, no se han notificado al SIVIGILA.

2.4.2 Malaria

Hasta la semana epidemiológica 21, se han notificado al SIVIGILA cuatro (4) casos de Malaria con procedencia Santander. La especie infectante en el 100% de los casos corresponde a *Plasmodium vivax*.

Malaria por municipio de procedencia. Santander, S.E. 1-21, 2026		
Municipio Procedencia	Casos	%
Cimitarra	2	50,0%
Barrancabermeja	1	25,0%
Sucre	1	25,0%
Santander	4	100%

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

A semana epidemiológica 21, en el departamento de Santander se han notificado 41 casos de Malaria, entre los cuales la oportunidad de diagnóstico, menor a 2 días, se registra para el departamento sólo en el 12,2% de los casos; y la oportunidad de tratamiento, menor a 24 horas, para el departamento se encuentra en el 61,0% de los casos. En cuanto a la hospitalización de malaria complicada para el departamento de Santander, se registra en el 100,0% de los 4 casos notificados.

Indicadores Malaria por Municipio de Notificación. Santander, S.E.1-21, 2026

Municipio Notificador	Casos	%Oportunidad Diagnóstico	%Oportunidad Tratamiento	Malaria Complicada	No. Casos Hospitalizados	% Hospitalización
Barrancabermeja	28	7,1%	60,7%	5	5	100%
Bucaramanga	5	40,0%	60,0%	1	1	100%
Floridablanca	3	0,0%	66,7%	1	1	100%
Piedecuesta	2	0,0%	50,0%			
Cimitarra	1	0,0%	100,0%			
Simacota	1	0,0%	100,0%			
Socorro	1	100,0%	0,0%			
Santander	41	12,2%	61,0%	7	7	100%

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

2.4.3 Fiebre Amarilla

Hasta la semana epidemiológica 21, se han notificado al SIVIGILA siete (7) casos probables de Fiebre Amarilla con procedencia Santander, de los municipios de Rionegro (1), San Gil (2) y Barrancabermeja (1), Floridablanca (1), Oiba (1) y Puente Nacional (1), los cuales se encuentran descartados.

Según el análisis de comportamientos inusuales, **13 municipios** del departamento registran un **incremento significativo** de casos de Leishmaniasis cutánea, en comparación con el comportamiento histórico de los últimos cinco años (**Betulia, Bolívar, Contratación, El Carmen de Chucurí, El Peñón, El Playón, Florián, Landázuri, Lebrija, Rionegro, Santa Helena del Opón, Sucre y Vélez**). Por el contrario, **cuatro municipios** registran **decremento significativo** (**Cimitarra, Floridablanca, Sabana de torres y San Benito**). Los **70 municipios** restantes **no presentan cambios significativos** en el comportamiento. El **Departamento de Santander** registra seis semanas consecutivas en **incremento**

República de Colombia

Gobernación de Santander

CÓDIGO

VERSIÓN**FECHA DE APROBACIÓN**


PÁGINA

34 de 105

Incidencia de Leishmaniasis Cutánea por municipio de Procedencia. Santander, SE 1-21, 2026.

Variable		Nº de casos	%	Incidencia
Sexo	Femenino	173	40,9%	48,0
	Masculino	250	59,1%	69,4
Área de ocurrencia	Cabecera municipal	14	3,3%	0,8
	Centro poblado y Rural disperso	409	96,7%	73,8
Tipo de Seguridad Social	Subsidiado	330	78,0%	28,5
	Contributivo	67	15,8%	6,0
	Excepción y Especiales	14	3,3%	19,2
	Indeterminado	4	0,9%	
	No asegurado	8	1,9%	
Curso de vida / Grupos de edad	Primera infancia 0 a 5 años	40	9,5%	129,3
	Infancia 6 a 11 años	50	11,8%	138,3
	Adolescencia 12 a 17 años	56	13,2%	145,4
	Juventud 18 a 28 años	97	22,9%	147,4
	Adultez 29 a 59 años	150	35,5%	97,4
	Vejez Mayores de 60 años	30	7,1%	48,9
TOTAL		423	100%	109,4

Los municipios con mayor proporción de casos notificados son **El Carmen de Chucurí 23,1% (101 casos)**, **El Playón 13,7% (58 casos)**, **Landázuri 11,1% (47 casos)**, **Rionegro 9% (38 casos)** y **Santa Helena del Opón 6,6% (28 casos)**.



Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

El municipio de **Santa Helena del Opón** registra la mayor incidencia con **1109,8 casos por cada 100.000 habitantes a riesgo**, seguido de **El Playón** con **850,7 casos por cada 100.000 habitantes a riesgo** y **Landázuri** con **681 casos por cada 100.000 habitantes a riesgo**.

El departamento de **Santander** registra una incidencia de **117,5 casos por cada 100.000 habitantes a riesgo**.

Los municipios con mayor número de casos crónicos notificados son **San Gil (12 casos)**, **Floridablanca (7 casos)**, **Bucaramanga y Mogotes (6 casos cada uno)**.

República de Colombia



GOBIERNO DE SANTANDER

Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	40 de 105

Casos de Intoxicaciones según grupo y Municipio de Procedencia. Santander, SE 01-21 2026

Municipios	GRUPO DE SUSTANCIA								Casos	%
	Medicamentos	Plaguicidas	Metanol	Metalos pesados	Solventes	Otras	Gases	Psicoactivas		
Bucaramanga	31	12	0	0	8	39	5	21	118	33,24%
Barrancabermeja	4	5	0	0	4	7	2	3	25	7,16%
Giron	10	2	0	0	3	5	0	5	25	7,16%
Floridablanca	7	2	1	0	2	5	2	3	22	6,30%
Piedecuesta	5	3	0	0	2	7	0	3	20	5,73%
Tona	0	17	0	0	0	0	0	0	17	4,87%
San Gil	9	4	0	0	0	0	1	1	15	4,30%
Los Santos	0	3	0	0	0	4	0	2	9	2,58%
Puerto Wilches	0	5	0	0	2	1	0	1	9	2,58%
Sabana de Torres	2	1	0	0	0	1	0	4	8	2,29%
Otros municipios	15	31	1	0	3	17	5	11	83	23,78%
Santer	83	85	2	0	24	86	15	54	349	100%
	24%	24%	1%	0%	7%	25%	4%	15%	100%	

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

El 56,16% de los casos se presentaron en el sexo Masculino el 79,37% de los casos se presentaron en cabecera municipal y el 51,86% de los casos pertenecen al régimen subsidiado. La condición final es vivo en un 99,43%.

Características sociodemográficas de los casos de intoxicaciones, Santander, SE 01- 21 2026

Variables		N° casos	%	Incidencia* 100.000 hab
Sexo	Masculino	196	56,16%	16,56
	Femenino	153	43,84%	12,47
Área	Cabecera m/pal	277	79,37%	14,86
	Centro poblado y Rural disperso	72	20,63%	13,61
Condición Final	Vivo	347	99,43%	14,39
	Muerto	2	0,57%	0,08
Tipo SS	Subsidiado	181	51,86%	15,61
	Contributivo	147	42,12%	13,36
	Excepción y Especial	14	4,01%	19,18
	Especial	4	1,15%	SD
	Indeterminado	4	1,15%	SD

Variables	N° casos	%	Incidencia* 100.000 hab
Total	349		14,48

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

Los tipos de exposición más frecuentes en los casos de intoxicaciones notificados al sistema de vigilancia a semana epidemiológica 20 corresponden a accidental con el 62.07%, seguido de Intencional psicoactiva con 16,38%, Automedicación 7,76%

Casos de Intoxicaciones según grupo y tipo de exposición, Santander, SE 01- 21 de 2026

Tipo de Exposición	GRUPO DE SUSTANCIA								Casos	%
	Medicamentos	Plaguicidas	Metanol	Metales pesados	Solventes	Otras	Gases	Psicoactivas		
Accidental	45	74	0	0	20	64	11	2	216	62,07%
Intencional Psicoactiva	7	1	1	0	1	2	0	45	57	16,38%
Automedicación	26	0	0	0	0	1	0	0	27	7,76%
Ocupacional	0	6	0	0	0	11	3	0	20	5,75%
Desconocida	4	2	1	0	2	5	1	3	18	5,17%
Posible delictivo	0	0	0	0	0	1	0	3	4	1,15%
Posible homicida	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0,86%
Suicidio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Santander	83	85	2	0	23	84	15	53	345	

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

El mayor número de casos se presenta en el rango de edad de 0 a 9 años con 34,10%, seguido por el rango de mayores de 10 -19 años con el 28,83 %. Los grupos de sustancias químicas más frecuentes en dichos rangos fueron medicamentos y sustancias psicoactivas

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	41 de 105


Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	42 de 105

En la siguiente tabla, se puede observar el comportamiento sociodemográfico del evento a semana 21 del año 2026 de enfermedades transmitidas por alimentos.

Entre 60 – 69 notificaron el 22,47% de los casos. Entre 30 – 39 años notificaron el 21,35% de los casos. Entre 70 años y más notificaron 21,35% de los casos. Entre 50 – 59 años notificaron el 12,36% de los casos. Los grupos entre 20 – 29 notificaron el 10,11% de los casos. Los

A semana epidemiológica 21 de 2026 se han reportado un total de 204 casos de sífilis gestacional. La prevalencia de este evento a semana 21 es de 11,03 casos de Sífilis en gestantes por 1000 nacidos vivos más mortinatos. El municipio que presenta una mayor razón de prevalencia es el municipio de California con un 76,92 seguido del municipio de Cimitarra con un 27,59 caso por cada 1000 nacidos vivos + mortinatos.



Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

**Comportamiento por municipio de residencia de casos Sífilis Gestacional, Santander.
SE 01-21 año 2026.**

Municipio	Casos	%	Prev X1000 NAC Vivos + Mortinatos
California	1	11,11%	76,92
Cimitarra	8	3,92%	27,59
El Carmen de Chucuri	3	1,47%	25,64
Barbosa	6	2,94%	25,21
Tona	1	11,11%	25
Puerto Wilches	7	3,43%	22,22
Barrancabermeja	50	24,51%	21,06
Socorro	6	2,94%	20,91
Los Santos	2	22,22%	15,38
Rionegro	3	3,33%	14,15
Bucaramanga	64	31,37%	13,4
Floridablanca	20	9,80%	8,85
Giron	14	6,86%	8,75
Velez	1	11,11%	8,47
El Playón	1	11,11%	8,06
Piedecuesta	12	5,88%	7,45
Sabana de Torres	2	22,22%	5,67
Lebrija	2	2,22%	4,84
San Gil	1	11,11%	1,76
Santander	204	100%	11,03

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

Según el comportamiento demográfico y social el 82,84% se registra en cabecera municipal. El 61,76% pertenece al régimen subsidiado.

CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA DE APROBACIÓN
PÁGINA

MI-GS-RG-537

1

04/11/2021

48 de 105

**Comportamiento demográfico y social de los casos confirmados de sífilis Gestacional.
Santander. SE 01-21 año 2026.**


Variables		Nº casos	%
Área	Cabecera m/pal	169	82,84%
	Rural Disperso	29	14,22%
	Centro Poblado	6	2,94%
Condición Final	Vivo	204	100,00%
Tipo SS	Subsidiado	126	61,76%
	Contributivo	53	25,98%
	No asegurado	24	11,76%
Rango de edad	10-14	2	0,98%
	15-19	39	19,12%
	20-29	125	61,27%
	30-39	34	16,67%
	40-49	4	1,96%
Total	204		

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

2.6.3 Sífilis Congénita

A semana epidemiológica 21 se han reportado un total de 10 casos. La prevalencia es de 0,54 casos de sífilis congénita por 1000 nacidos vivos y mortinatos. El 100,00% de los casos notificados como sífilis congénita cumplen con la definición de caso. El 100,00 % de las madres de los casos notificados como sífilis congénita fueron notificadas como sífilis gestacional.

Incidencia de Sífilis Congénita. Santander. SE 01-21 año 2026.



Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

De los casos de sífilis congénita, reportados al sistema de vigilancia, el 100% de los casos confirmados por nexo epidemiológico.

A continuación, se presenta tabla sociodemográfica con la situación de Lepra, semana 21–2026.

Notificación de tuberculosis Sensible por tipo de caso, Santander, semanas epidemiológicas 01-21, 2026.

Tipo de caso	TB Sensible		Total	%
	Pulmonar	Extrapulmonar		
Confirmado por laboratorio	481	51	532	88%
Confirmado por clínica	47	23	70	12%
Confirmado por nexo epidemiológico	0	0	0	0%
Total	528	74	602	100%

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

Describe el comportamiento sociodemográfico de los casos de Tuberculosis sensible, Santander semanas 01 –21 - 2025.

Variables		N° casos	%
Sexo	Masculino	431	71,6%
	Femenino	171	28,4%
Área	Cabecera m/pal	539	89,5%
	Rural Disperso	51	8,5%
	Centro Poblado	12	2,0%
Condición Final	Vivo	563	93,5%
	Muerto	39	6,5%
Tipo SS	Subsidiado	292	48,5%
	Excepcion	147	24,4%
	Contributivo	140	23,3%
	No asegurado	14	2,3%
	Especial	7	1,2%
	Indeterminado	2	0,3%
Rango de edad	< 1 año	0	0,0%
	1-4	1	0,2%
	5-9	1	0,2%
	10-14	6	1,0%
	15-19	28	4,7%
	20-29	139	23,1%

Variables	N° casos	%
30-39	117	19,4%
40-49	89	14,8%
50-59	70	11,6%
60-69	62	10,3%
70 y mas	89	14,8%
Total	602	

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026

De los casos de tuberculosis sensible, se presentan 74 casos extrapulmonar, cuya localización anatómica corresponde a cuarenta (40) casos pleurales.

Tuberculosis Sensible extrapulmonar por localización anatómica, Santander, semanas epidemiológicas 01-21, 2026.

LOCALIZACION	Casos	%
PLEURAL	40	54,1%
GANGLIONAR	8	10,8%
OTRO	8	10,8%
PERITONEAL	5	6,8%
MENINGEA	4	5,4%
OSTEOARTICULAR	3	4,05%
PERICARDICA	3	4,05%
RENAL	1	1,35%
INTESTINAL	1	1,35%
GENITOURINARIA	1	1,35%
Santander	74	100%

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	59 de 105

Variable	Categoría	Casos (n)	Porcentaje (%)
Sexo	Masculino	35	62,50%
	Femenino	21	37,50%
Área	Cabecera m/pal	41	73,21%
	Centro Poblado	2	3,57%
	Rural Disperso	13	23,21%
Tipo de aseguramiento	Subsidiado	31	55,36%
	Contributivo	22	39,29%
	No asegurado	3	5,36%
	Indeterminado	0	0,00%
	Excepción	0	0,00%
	Especial	0	0,00%
Grupo de edad	Primera Infancia	2	3,57%
	Infancia	12	21,43%
	Edad escolar	15	26,79%
	Preadolescencia	12	21,43%
	Adolescencia	15	26,79%

El 50,0% de los pacientes lograron la **confirmación diagnóstica** dentro de los ocho días posteriores a la presunción.

El 83,3% **inició tratamiento** en menos de cinco días tras la confirmación diagnóstica.

Estos resultados muestran avances importantes, pero también la necesidad de fortalecer la fase de confirmación para garantizar una atención integral y oportuna.

Indicadores de oportunidad	Resultado	Indicador
Oportunidad estimada en la presunción diagnóstica (OPDx) (diagnóstico)	88,9%	Alta ≤2 días
	0,0%	Media 3-10 día
	0,0%	Baja ≥ 11 días
Oportunidad estimada en la confirmación diagnóstica de leucemias (OCDx)	50,0%	Alta ≤8 días
	16,7%	Media 9-15 días
	16,7%	Baja ≥ 16 días.
Oportunidad estimada en el inicio de tratamiento de Leucemias (OITTO)	83,3%	Alta ≤ 5 días
	5,6%	Baja ≥ 6 días

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

2.8.2 Cáncer de Mama y Cuello Uterino

A la fecha se han notificado 195 casos de los cuales 107 corresponden a cáncer de mama (61,0%) y 75 a cáncer de cuello uterino (38,5%). En comparación con el año anterior, se observa un decremento 5,17%. Es importante señalar que los datos están sujetos a revisión continúa debido a notificaciones tardías, ajustes técnicos y procesos de validación de calidad.

La tasa de incidencia de cáncer de mama y de cuello uterino en mujeres mayores de 18 años es de 20,88 casos por cada 100.000 mujeres en este grupo poblacional, considerado como la

En el análisis de los indicadores de oportunidad estimada para **leucemias** en menores de 18 años en Santander, se evidenció que el 88,9% (16) de los casos alcanzaron la **presunción diagnóstica** en menos de dos días.

Variable	Categoría	Casos (n)	Porcentaje (%)
	Indeterminado	0	0,00%
	Excepción	0	0,00%
	Especial	0	0,00%
Grupo de edad	0 a 5	1	7,69%
	6 a 11	0	0,00%
	12 a 17	2	15,38%
	18 a 26	2	15,38%
	29 a 59	8	61,54%
	60 y mas	0	0,00%

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

2.8.4 Enfermedades Huérfanas


Para esta semana de análisis se han notificado un total de 190 casos de enfermedades huérfanas. De estos, 116 casos (61,1%) corresponden a diagnósticos realizados en el presente año, mientras que 74 casos (38,9%) pertenecen a años anteriores.

En comparación con el año anterior, se observa un decremento del -17,03 % en el número de casos reportados. La incidencia departamental acumulada para el año 2026, según residencia, es de 4,81 casos por cada 100,000 habitantes. El 59,47% (113) son del sexo femenino el resto masculino.

Los municipios de concentran las cinco tasas de incidencia más elevadas, El palmar (64,60), Cabrera (47,26), Vetas (46,43), Chima (30,13) y Suaita (19,44) todas superiores al promedio departamental. Aunque en términos absolutos notifican pocos casos, estas localidades reflejan un impacto proporcionalmente alto en poblaciones pequeñas, lo que subraya la necesidad de enfoques diferenciados en vigilancia, atención y planificación territorial. El mapa muestra las incidencias de acuerdo con el lugar de residencia.En relación con la oportunidad de notificación de casos nuevos de enfermedades huérfanas durante el año 2026, se observa que el 54,3%

de los reportes se realizaron dentro del parámetro establecido (≤ 1 día desde la confirmación diagnóstica). Asimismo, se identifican municipios que, pese a haber registrado antecedentes de casos en años anteriores, no reportaron nuevos eventos en 2026, situación que podría explicarse por variaciones epidemiológicas o por fenómenos de subregistro.

Mapa de tasa de notificación por entidad territorial de enfermedades huérfanas en Santander, semanas epidemiológicas 1 a 21, 2026.



Fuente: Sivigila Santander. Tasa por 100.000 habitantes, según proyecciones de población DANE 2026.

CÓDIGO

VERSIÓN**FECHA DE APROBACIÓN**

04/11/2021

PÁGINA

64 de 105

Proporción de las diez principales enfermedades huérfanas, semanas epidemiológicas 1 a 21, Santander, 2026

Nombre de la enfermedad	Casos (n)	Porcentaje (%)
Enfermedad de Von Willebrand	20	10,5%
Esclerosis sistémica cutánea limitada	14	7,4%
Esclerosis sistémica cutánea difusa	12	6,3%
Síndrome de Guillain-Barre	9	4,7%
Estenosis pulmonar valvular	9	4,7%
Miastenia grave	5	2,6%
Esclerosis Múltiple	5	2,6%
Neuromielitis óptica espectro	5	2,6%
Enfermedad de Kawasaki.	5	2,6%
Hernia diafragmática	5	2,6%
Otras	101	53,2%
Total	190	100,0%

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

2.9.1 Intento de Suicidio

A semana epidemiológica 21 de 2026, se han notificado al SIVIGILA 689 intentos de suicidio; a la misma semana epidemiológica del año 2025 se notificaron 700 casos, lo que evidencia un decremento del 1,6% en el evento. Los Municipios que más aportan casos son: Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón, Piedecuesta.

La tasa de incidencia para Santander es de 28,6 casos por cada 100.000 habitantes. En la siguiente tabla se evidencian los Municipios con mayor incidencia de intento de suicidio en el Departamento de Santander.

Casos notificados vs incidencia por municipio de procedencia de Intento de Suicidio, Santander, S.E 01-21, 2026pr.

MUNICIPIO	Casos	%	Incidencia
California	2	0,3%	78,9
Betulia	5	0,7%	72,6
Oiba	8	1,2%	68,9
Galan	2	0,3%	65,3
Malaga	14	2,0%	57,4
San Gil	34	4,9%	47,8
San José de Miranda	2	0,3%	45,1
Giron	75	10,9%	42,2
Bucaramanga	250	36,3%	40,4
Suaita	4	0,6%	38,9
Socorro	14	2,0%	37,7
Guapota	1	0,1%	37,5

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	65 de 105

MUNICIPIO	Casos	%	Incidencia
Los Santos	3	0,4%	17,4
Simacota	2	0%	17,0
Concepcion	1	0,1%	16,4
Pinchote	1	0,1%	16,2
Barichara	2	0,3%	15,2
Sucre	1	0,1%	13,6
Cerrito	1	0,1%	13,1
Puente Nacional	2	0,3%	13,0
El Carmen de Chucuri	3	0,4%	12,1
San Vicente de Chucuri	4	0,6%	11,1
Villanueva	1	0,1%	10,9
Landazuri	1	0,1%	9,4
Barbosa	3	0,4%	8,8
Puerto Wilches	3	0,4%	8,2
Velez	2	0,3%	7,3
El Playón	1	0,1%	6,5
SANTANDER	689	100%	28,6

En el 47,2% con 325 casos de Intento de Suicidio son desencadenados por problemas familiares, seguidos por problemas de pareja con el 26,0% con 179 casos.

Municipio	Casos	%	Incidencia
Contratación	5	0,17%	117,7
Jesús María	4	0,1%	116,8
Oiba	13	0,4%	111,9
Villanueva	10	0,3%	108,5
Confinés	4	0,1%	107,8
San Vicente de Chucuri	38	1,3%	105,8
Ocamonte	7	0,2%	105,6
Aratoca	9	0,3%	101,8
Chipatá	5	0,2%	95,3
Guavatá	4	0,1%	92,7
Chima	3	0,10%	90,4
Floridablanca	283	9,5%	89,8
Guaca	6	0,2%	87,9
Los Santos	15	0,5%	86,9
Barichara	11	0,4%	83,6
Barbosa	28	0,9%	81,8
Socorro	28	0,9%	75,4
San Miguel	2	0,07%	75,0
Santa Barbara	2	0,1%	74,9
Hato	2	0,07%	74,5
Rionegro	20	0,7%	74,4
Puente Nacional	11	0,4%	71,7
Valle de San José	5	0,2%	69,6
San Andrés	6	0,2%	68,4
Zapatoca	7	0,23%	68,0

Municipio	Casos	%	Incidencia
Sucre	5	0,2%	67,8
Cerrito	5	0,2%	65,7
Carcasí	3	0,10%	60,9
Betulia	4	0,1%	58,1
Florian	3	0,1%	52,6
Aguada	1	0,0%	52,3
Pinchote	3	0,1%	48,6
Velez	13	0,4%	47,7
Capitanejo	3	0,1%	47,4
Vetas	1	0,03%	46,4
Puerto Wilches	16	0,54%	43,8
Macaravita	1	0,0%	40,4
la paz	2	0,1%	39,4
El Peñón	2	0,07%	37,6
Bolivar	4	0,1%	34,6
Concepcion	2	0,1%	32,7
Santa Helena del Opón	1	0,0%	28,8
El Carmen de Chucuri	7	0,2%	28,2
Albania	1	0,0%	23,6
Güepsa	1	0,0%	17,7
Simacota	2	0,1%	17,0
La Belleza	1	0,0%	15,8
SANTANDER	2986	1	123,9

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

República de Colombia



Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	69 de 105

82 Municipios de Santander han reportado un caso de violencia en lo corrido del año. En el Departamento de Santander se describen las características sociodemográficas en la siguiente tabla.

Comportamiento demográfico y social de los casos de Violencia de género e intrafamiliar, Santander, semanas epidemiológicas 01- 21, 2026pr.

Variables	Nº casos	%	P. Incidencia
Sexo	Femenino	2040	68,3%
	Masculino	946	31,7%
Área	Cabecera m/pal	2353	78,8%
	Centros Poblados y Rural	633	21,2%
	Disperso		
Condición Final	Vivo	2983	99,90%
	Muerto	3	0,10%
Tipo SS	Subsidiado	1898	63,6%
	Contributivo	881	29,5%
	Excepcion & Especial	121	4,0%
	No asegurado	71	2,4%
	Indeterminado	15	0,5%
Total	2986	100%	

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

En la siguiente tabla se describen el número de casos y la Incidencia de Violencia de Género e Intrafamiliar por sexo y rango de edad. La mayor incidencia en el sexo Masculino se presenta en el grupo de < 1 año; mientras que en el sexo Femenino dicha incidencia se encuentra en el grupo de 10-14 años.

Nº Casos vs Incidencia de Violencia de género e intrafamiliar por rango de edad y sexo, Santander, semanas epidemiológicas 01- 21, 2026pr.


Rango de edad	Masculino	Femenino	Total	%	P.I Masculino	P.I Femenino
< 1 año	45	49	94	3,15%	303,40	348,56
1-4	186	202	388	12,99%	296,97	340,80
5-9	191	200	391	13,09%	223,24	247,14
10-14	179	390	569	19,06%	197,41	454,11
15-19	156	264	420	14,07%	166,44	296,86
20-29	36	315	351	11,75%	18,65	167,50
30-39	33	279	312	10,45%	17,89	150,34
40-49	20	134	154	5,16%	12,91	82,69
50-59	16	78	94	3,15%	12,48	55,18
60-69	25	46	71	2,38%	25,66	39,93
70 y mas	59	83	142	4,76%	75,53	78,44
Total	946	2040	2986	100%	79,93	166,24

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

Con respecto a la modalidad **No sexual** es la Privación y negligencia con el 39,0% (1165 casos) y una incidencia de 48,3 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de la violencia física con un 36,5% (1090 casos) y una incidencia de 45,2 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la modalidad **Sexual**, Los Actos sexuales con uso de la fuerza con el 6,6% (197 casos) y una incidencia de 8,2 casos por cada 100.000 habitantes y el Acceso carnal con el 5,2% (156 casos), una incidencia de 6,5 casos por cada 100.000 habitantes.

A continuación, se evidencia la tasa de incidencia por tipo de violencia.

TASA DE MORTALIDAD POR EVENTO MORTALIDAD IRA, EDA O DNT EN MENORES DE 5 AÑOS, SANTANDER 2017-2026.



La gráfica muestra la evolución temporal de la mortalidad infantil por tres eventos trazadores: Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Desnutrición (DNT). En términos generales, se observa un comportamiento fluctuante, de baja frecuencia absoluta, compatible con eventos poco comunes donde pequeños cambios en el número de defunciones producen variaciones importantes en la tasa.

2.11.1 Infección Respiratoria Aguda (IRA)

La IRA mantuvo tasas elevadas durante el periodo prepandémico (3,9 → 6,8 → 6,2 entre 2017 y 2019), con un patrón cíclico característico asociado a las temporadas de baja temperatura y circulación de virus respiratorios.

En 2020 cae abruptamente a 1,8, hallazgo compatible con el efecto de las medidas no farmacológicas de la pandemia COVID-19 (uso de tapabocas, distanciamiento, cierre de

jardines infantiles), que redujeron la transmisión de virus respiratorios estacionales. Sin embargo, en 2021 rebota a 6,7, posiblemente por la "deuda inmunológica" pediátrica y la circulación atípica del VSR descrita ampliamente en la literatura post-COVID.

Desde 2022 se observa una tendencia descendente sostenida (1,9 → 3,8 → 4,5 → 1,3 → 0,6), aunque con un repunte en 2024 que merece análisis de cohortes específicas.

2.11.2 Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

La EDA mostró tasas de cero o cercanas a cero entre 2017 y 2022 (excepto el pico aislado de 1,2 en 2020), lo que reflejaba un control efectivo.

A partir de 2023 se produce un cambio epidemiológico marcado: la tasa salta a 4,4 y alcanza su máximo histórico de 5,3 en 2024, superando incluso a la IRA por primera vez en la serie. Este patrón es atípico y sugiere posibles determinantes a investigar: deterioro en cobertura de vacunación contra rotavirus, problemas de acceso a agua segura y saneamiento, eventos climáticos extremos (fenómeno de El Niño 2023-2024), o desplazamientos poblacionales.

La caída a 0,0 en 2025 y 0,6 en 2026 podría indicar que el evento fue contenido, pero amerita vigilancia estricta.

2.11.3 Desnutrición (DNT)

La DNT mostró el comportamiento más estable de la serie, con una tasa basal de 0,6 entre 2017 y 2022. En 2023 se registra un pico anómalo de 2,5, coincidente con el inicio del repunte de EDA, lo que sugiere una posible interacción sindémica: la diarrea persistente es causa directa de desnutrición aguda, y la desnutrición aumenta la letalidad por diarrea.

Este es un hallazgo epidemiológicamente relevante. Tras el pico, la tasa retorna a niveles bajos (0,6 en 2024; 0,0 en 2025 y 2026).

Razón de MME según municipio de residencia, Colombia a PE III de 2026				
Cod mpio	Municipio	Nº casos	Nacimientos	Razón MME
68001	BUCARAMANGA	77	1491	51,6
68051	ARATOCA	1	18	55,6
68077	BARBOSA	5	68	73,5
68079	BARICHARA	2	20	100,0
68081	BARRANCABERMEJA	42	724	58,0
68132	CALIFORNIA	1	3	333,3
68147	CAPITANEJO	1	10	100,0
68152	CARCASI	1	4	250,0
68162	CERRITO	1	17	58,8
68167	CHARALA	3	25	120,0
68179	CHIPATA	3	15	200,0
68190	CIMITARRA	5	81	61,7
68207	CONCEPCION	2	6	333,3
68229	CURITI	2	33	60,6
68235	EL CARMEN DE CHUCURI	3	35	85,7
68250	EL PEÑON	1	9	111,1
68255	EL PLAYON	1	33	30,3
68266	ENCISO	1	7	142,9
68271	FLORIAN	1	5	200,0
68276	FLORIDABLANCA	42	742	56,6


BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	75 de 105

Razón de MME según municipio de residencia, Colombia a PE III de 2026				
68307	GIRON	32	524	61,1
68320	GUADALUPE	1	4	250,0
68327	GUEPSA	3	6	500,0
68377	LA BELLEZA	3	25	120,0
68385	LANDAZURI	3	1	3000,0
68406	LEBRIJA	8	125	64,0
68418	LOS SANTOS	2	27	74,1
68432	MALAGA	2	65	30,8
68468	MOLAGAVITA	1	10	100,0
68498	OCAMONTE	2	6	333,3
68547	PIEDECUESTA	17	488	34,8
68572	PUENTE NACIONAL	2	25	80,0
68575	PUERTO WILCHES	9	101	89,1
68615	RIONEGRO	9	56	160,7
68655	SABANA DE TORRES	2	108	18,5
68673	SAN BENITO	1	2	500,0
68679	SAN GIL	8	171	46,8
68689	SAN VICENTE DE CHUCURI	5	63	79,4
68755	SOCORRO	5	78	64,1
68770	SUAITA	1	14	71,4
68773	SUCRE	1	9	111,1
68855	VALLE DE SAN JOSE	1	18	55,6
68861	VELEZ	7	36	194,4

Razón de MME según municipio de residencia, Colombia a PE III de 2026				
68895	ZAPATOCA	3	22	136,4

Morbilidad Materna Extrema por entidad territorial de residencia, Santander, 2026 a SE 21



Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Oportunidad notificación casos de Morbilidad Materna Extrema, Santander, 2026 a SE 21

	PE IV DE 2026 (SE 01 a 16)			
codigo completo	Oportunos	Total casos notificados	% Oportunos	Interpretación
680810070702	1	2	50,0	Deficiente
680810192201	2	2	100,0	Bueno
680810079701	15	23	65,2	Deficiente
680810142101	19	22	86,4	Regular
680010172901	1	1	100,0	Bueno
680010043101	59	61	96,7	Bueno
680010070101	10	10	100,0	Bueno
680010079201	100	104	96,2	Bueno
681670333401	0	1	0,0	Deficiente
682290071601	1	1	100,0	Bueno
682350074901	1	1	100,0	Bueno
682660076401	1	1	100,0	Bueno
682760071701	7	7	100,0	Bueno
682760028901	22	22	100,0	Bueno
682760166601	26	43	60,5	Deficiente
683850072301	1	1	100,0	Bueno
684320079601	6	6	100,0	Bueno
684680079101	1	1	100,0	Bueno
685470028910	2	2	100,0	Bueno

	PE IV DE 2026 (SE 01 a 16)			
codigo completo	Oportunos	Total casos notificados	% Oportunos	Interpretación
685750073201	2	2	100,0	Bueno
686550060501	1	1	100,0	Bueno
686550073401	1	1	100,0	Bueno
686790079301	7	7	100,0	Bueno
687550079901	8	11	72,7	Regular
688610079501	15	15	100,0	Bueno

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Durante el período de estudio se notificaron 443 casos de morbilidad materna extrema, evidenciando importantes desigualdades en su distribución. Aunque las cabeceras municipales concentran el mayor número absoluto de casos (360; 81,3%), son los centros poblados los que presentan el riesgo más elevado con una razón de 35,71 casos por cada 1.000 nacidos vivos, superando ampliamente a las cabeceras (40,77) y al área rural dispersa (30,45). En cuanto al aseguramiento, si bien el régimen subsidiado aporta la mayoría de los casos (255; 45,89%). Por grupos de edad, la mayor carga de morbilidad se concentra en mujeres de 20-29 años 222 (50%), al observar la razón más elevada es para el grupo de edad de 15-19 años (43,25).

Características sociodemográficas de casos de Morbilidad Materna Extrema, Santander, 2026 a SE 21

Variables		Nº Casos	%	Razón (X 1.000 NV)
Area	Cabecera m/pal	360	81,3%	40,77
	Rural Disperso	69	15,6%	30,45
	Centro Poblado	14	3,2%	35,71
Tipo SS	Subsidiado	255	57,6%	45,89
	Contributivo	148	33,4%	28,07
	No asegurado	20	4,5%	40,16
	Excepción	18	4,1%	113,21



CÓDIGO

VERSIÓN**FECHA DE APROBACIÓN**

04/11/2021

PÁGINA

78 de 105

MPNT por entidad territorial de residencia, Santander, 2026 a SE 21

Municipio	Casos	%	Nacidos Vivos	Razón
Puerto Wilches	3	3,95%	28	107,14
Floridablanca	8	10,53%	4463	1,8
Sabana de Torres	2	2,63%	35	57,1
Barrancabermeja	13	17,11%	2936	4,4
Bucaramanga	16	21,05%	8550	1,9
Girón	13	17,11%	22	590,9
Piedecuesta	8	10,53%	200	40,0
Barichara	1	1,32%	1	1000,0
San Gil	2	2,63%	1015	2,0
San Vicente de Chucuri	2	2,63%	15	133,3
Otros municipios	8	10,53%	4238	1,9
Santander	76	100%	19052	4,0

Map of the Tona region in Argentina, showing the ratio of population to area for each municipality. The map uses a color scale from light blue (0.0) to dark brown (1000.0). Tona is highlighted in dark brown, indicating a high ratio. Other municipalities like Gir... and Sabana De... are also highlighted in orange, indicating higher ratios than most. A legend on the right shows the color scale for 'Razon'.

Municipality	Razon (Ratio)
Tona	1000.0
Gir...	409.1
Sabana De...	57.1
Rio...	250.0
Le...	58.8
Barranc...	2.0
San Vic...	0.0
El Carm...	0.0
San...	0.0
Oiba	125.0
Coro...	0.0
En...	0.0
Gá...	0.0
Cimitarra	0.0
Puer to...	0.0
Si...	0.0
L...	0.0
B...	0.0
S...	0.0
500.0	500.0

Con tecnología de Bing
© Open Places, Overture Maps Foundation

Con tecnología de Bing
© Open Places, Overture Maps Foundation

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	79 de 105

Según el momento de ocurrencia de la mortalidad, el 45% de los casos de MPNT corresponde a muertes ocurridas anteparto, 30% corresponde a muertes prealta postparto y el 13,5% muertes ocurridas en el postalta postparto

Momento de ocurrencia de la Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía respecto al parto, Santander, 2026 a SE 21

Etapa	Porcentaje
Anteparto	45,0%
Prealta en Postparto	30,0%
Intraparto	15,0%
Postalta en Postparto	10,0%
Reingreso Postparto	0,0%
No aplica/ nunca fue a la Institución de salud en Postparto	0,0%

Dentro de las causas básicas de MPNT la insuficiencia renal congénita, asfisia del nacimiento-severa, fracaso de la inducción medica del trabajo de parto son las que representan mayor proporción de casos.

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Características sociodemográficas de casos de Defectos congénitos, Santander, 2026 a SE 21

Variables		Nº casos	%
Sexo	Masculino	70	54,3%
	Femenino	59	45,7%
Área	Cabecera m/pal	74	57,4%
	Rural Disperso	55	42,6%
	Centro Poblado	74	57,4%
Condición Final	Vivo	126	97,0%
	Muerto	3	2,3%
	No sabe	-	-
Tipo SS	Subsidiado	70	54,3%
	Contributivo	44	34,1%
	Especial	15	11,6%
	Excepción	-	-
Total		129	

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

El análisis de los defectos congénitos reportados muestra que las cardiopatías congénitas constituyen el grupo más relevante, encabezado por el **defecto del tabique ventricular** (8 casos), seguido por el **conducto arterioso permeable** (5 casos) y el **defecto del tabique auricular** (4 casos). Otras malformaciones cardíacas como la hipoplasia del corazón derecho, la conexión anómala total de venas pulmonares y la estenosis de válvula pulmonar también se presentaron, aunque con menor frecuencia (2 casos cada una). Fuera del grupo cardiovascular, destacan la **atresia de esófago con fístula traqueoesofágica** (4 casos), las **deformidades congénitas de la cadera** (8 casos sumando sus diferentes especificaciones), la **hernia diafragmática congénita** (3 casos), el **síndrome de Down** (3 casos) y la **gastrosquisis** (2 casos). La presencia de múltiples defectos con un solo caso cada uno sugiere una alta diversidad de anomalías, lo que orienta hacia la necesidad de estudios genéticos y ecografías morfológicas detalladas.

Defectos Congénitos	Casos
CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	11
DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR	10
DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR	7
ATRESIA DEL ESOFAGO CON FISTULA TRAQUEOESOFAGICA	4
CADERA INESTABLE	3
OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA	3
POLIDACTILIA, NO ESPECIFICADA	3
HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	3
GASTROSQUISIS	3
SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	3
MICROTIA	2
MALFORMACION CONGENITAS DE LAS CAMARAS CARDIACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA	2
ESTENOSIS CONGENITA DE LA VALVULA PULMONAR	2
SINDROME DE HIPOPLASIA DEL CORAZON DERECHO	2
CONEXIÓN ANOMALA TOTAL DE LAS VENAS PULMONARES	2
LABIO LEPORINO, BILATERAL	2
DEFORMIDAD CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA	2
CRANEOSINOSTOSIS	2
MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	2
ENCEFALOCELE, NO ESPECIFICADO	1
MICROCEFALIA	1
ESPINA BIFIDA, NO ESPECIFICADA	1
MALFORMACION CONGENITA DEL SISTEMA NERVIOSO, NO ESPECIFICADA	1
VENTRICULO CON DOBLE ENTRADA	1
DEFECTO DEL TABIQUE AURICULOVENTRICULAR	1
ESTENOSIS CONGENITA DE LA VALVULA AORTICA	1
INSUFICIENCIA CONGENITA DE LA VALVULA AORTICA	1

Defectos Congénitos	Casos
INSUFICIENCIA MITRAL CONGENITA	1
COARTACION DE LA AORTA	1
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL PULMON	1
LABIO LEPORINO, LINEA MEDIA	1
LABIO LEPORINO, UNILATERAL	1

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Priorización de los defectos congénitos en seguimiento, Santander, 2024 -2026 (a SE 21)

Durante el período evaluado, se observó que la mayoría de los defectos congénitos se encuentran dentro del rango esperado según las referencias epidemiológicas. En el sistema nervioso central (SNC), la hidrocefalia presentó una razón observada/esperada (O/E) de 3.00, lo que indica un ligero aumento en comparación con lo esperado, aunque aún dentro del rango normal. Por otro lado, defectos como la anencefalia (1.20) y la espina bífida (0.33) mostraron frecuencias similares o inferiores a las proyectadas. En el sistema osteomuscular, la gastroquisis y el onfalocele registraron una razón O/E de 1.00, lo que refleja una concordancia exacta con los valores esperados. Sin embargo, defectos como las deformidades congénitas de los pies y la polidactilia estuvieron por debajo de lo esperado.

En cuanto a los defectos cromosómicos, el síndrome de Edwards destacó con una razón O/E de 4.00, superando significativamente lo esperado y requiriendo mayor atención en futuros análisis. Por el contrario, el síndrome de Down (0.31) y el síndrome de Patau (0.67) se mantuvieron dentro de los parámetros normales. En el sistema circulatorio, la coartación de la aorta (0.55) y la transposición de grandes vasos (0.29) presentaron frecuencias inferiores a las esperadas, mientras que, en las fisuras de labio y paladar, solo la fisura de paladar (0.86) se acercó al valor de referencia.

Priorización de los defectos congénitos en seguimiento, Santander, 2024 -2026 (a SE 21)						
DEFECTO CONGÉNITO		RAZÓN O/E	Razón esperada	Categoría (MMWR)	Poisson	Razón
SNC	Anencefalia (Q000)	1	1	Dentro del rango	0,21	1,20
	Encefalocele (Q010 – Q011 – Q012 – Q018 –Q019)	0	1	Dentro del rango	0,61	0,00
	Espina bífida (Q050 a Q059)	0	1	Dentro del rango	0,15	0,33
	Hidrocefalia (Q030 – Q031 – Q038 – Q039)	3	1	Dentro del rango	0,06	3,00
	Holoprosencefalia (Q042)	0	1	Dentro del rango	0,01	0,00
Sistema osteomuscular	Gastroquisis (Q793)	1	1	Dentro del rango	0,37	1,00
	Onfalocele (Q792)	1	1	Dentro del rango	0,37	1,00
Defectos Extremidades	Deformidad congénita de los pies (Q660 a Q669)	0	1	Por debajo	0,00	0,22
	Polidactilia (Q690 - Q691 - Q692 - Q699)	0	1	Por debajo	0,00	0,21
	Defectos por reducción del miembro superior (Q710 a Q719)	0	1	Dentro del rango	0,21	0,40
	Defectos por reducción del miembro inferior (Q720 a Q729)	2	1	Dentro del rango	0,30	2,00
Sistema circulatorio	Coartación de la aorta (Q251)	1	1	Dentro del rango	0,11	0,55
	Tetralogía de Fallot (Q213)	0	1	Dentro del rango	0,08	0,40
	Transposición de los grandes vasos (Q201 - Q202)	0	1	Dentro del rango	0,11	0,29
Fisura de labio y paladar	Fisura de paladar (Q351 - Q353 - Q355 - Q357 - Q359)	1	1	Dentro del rango	0,22	0,86
	Labio leporino (Q360 - Q361 - Q369)	0	1	Por debajo	0,01	0,15

Priorización de los defectos congénitos en seguimiento, Santander, 2024 -2026 (a SE 21)						
DEFECTO CONGÉNITO		RAZÓN O/E	Razón esperada	Categoría (MMWR)	Poisson	Razón
Defectos cromosómicos	Fisura del paladar con labio leporino (Q370 a Q375 -Q378 - Q379)	0	1	Por debajo	0,00	0,13
	Síndrome de Down (Q900 - Q901 - Q902 - Q909)	0	1	Dentro del rango	0,00	0,31
	Síndrome de Edwards (Q910 a Q913)	4	1	Por encima	0,00	4,00
	Síndrome Patau (Q914 a Q917)	1	1	Dentro del rango	0,33	0,67

2.13 Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)

2.13.1 Infecciones Asociadas a Dispositivos (IAD)


Hasta la semana epidemiológica 21 de 2026, se han notificado al SIVIGILA 86 casos de Infecciones asociadas a dispositivos a diferencia del año 2025 donde se presentaron 88 casos, lo cual representa un decremento de -2%.

El comportamiento de las Infecciones Asociadas a Dispositivos (IAD) durante el periodo 2020–2026 muestra una variación temporal estrechamente relacionada con el contexto epidemiológico de la pandemia por COVID-19. En 2020 y, de manera más marcada en 2021, se observa un incremento significativo de los casos, alcanzando su punto máximo entre mayo y julio de 2021, periodo en el que se registra el mayor número de eventos, con predominio de neumonía asociada a ventilación (NAV) y de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC). Este aumento coincide con la mayor presión sobre los servicios hospitalarios, la expansión de camas UCI y el uso intensivo de dispositivos invasivos en pacientes críticos. A partir de 2022, la gráfica evidencia una disminución progresiva de los casos y una posterior estabilización durante 2023, 2024 y 2025, con fluctuaciones mensuales

de menor magnitud y predominio de ITS-AC, mientras que la infección del tracto urinario asociada a catéter (ISTU-AC) se mantiene en niveles más bajos. La línea de tendencia del total de casos ($y = -0,5158x + 57,568$) indica una tendencia general decreciente, con una reducción aproximada de 0,5 casos por periodo. No obstante, el coeficiente de determinación ($R^2 = 0,1971$) muestra que esta tendencia explica solo una proporción limitada de la variabilidad, lo que sugiere que el comportamiento de las IAD continúa influenciado por factores epidemiológicos y operativos del sistema de salud, más allá de la tendencia global descendente.

Semanalmente el número de casos registrados se revisa debido a la notificación tardía del evento, ajustes y a depuración por calidad del dato.

Tendencia de casos de Infecciones Asociadas a Dispositivos notificados en Santander, por mes años 2020 a mayo 2026



Fuente: SIVIGILA WEB

*NAV: Neumonías asociadas a ventilador

*ITS-AC: Infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter central

*ISTU-AC: Infecciones sintomáticas de tracto urinario asociadas a Catéter

Durante los primeros cuatro meses de 2026 en Santander, las incidencias de infecciones asociadas a dispositivos (IAD) por 1.000 días dispositivo mostraron un comportamiento

República de Colombia



Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	86 de 105

Desde un enfoque epidemiológico, el indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de infecciones asociadas a dispositivos (IAD) en UCI adulto por UPGD durante el periodo enero a abril de 2026 muestra un desempeño global alto y consistente en la totalidad de las instituciones evaluadas. Se evidencia un cumplimiento del 100%, lo que refleja una adecuada adherencia a los lineamientos de vigilancia epidemiológica y un fortalecimiento en los procesos de reporte oportuno.

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abri	%
BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO ECOPETROL	1	1	1	1	100
	UCI SALUD VITAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	100
BUCARAMANGA	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	1	1	1	1	100
	CLINICA CHICAMOCOA SA	1	1	1	1	100
	CLINICA GESTIONAR BIENESTAR	1	1	1	1	100
	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	1	1	1	1	100
	CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	1	1	1	1	100
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1	1	1	1	100
	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANG	1	1	1	1	100
	SEDE GONZALEZ VALENCIA	1	1	1	1	100
FLORIDABLANCA	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	1	1	1	1	100
	FUNDACION FOSUNAB	1	1	1	1	100
	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	1	1	1	1	100
	VIVASALUD IPS	1	1	1	1	100
PIEDRECUESTA	CLINICA PIEDECUESTA SA	1	1	1	1	100
	HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	100
SOCORRO	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	1	1	1	1	100

Desde un enfoque epidemiológico, el indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de infecciones asociadas a dispositivos (IAD) en UCI pediátrica por UPGD durante el periodo enero a abril de 2026 muestra un desempeño altamente satisfactorio en la totalidad de las instituciones evaluadas, con cumplimiento del 100%. En conjunto, aunque el comportamiento general refleja un sistema de vigilancia fortalecido en la mayoría de las UPGD, es necesario implementar acciones de seguimiento, asistencia técnica y verificación en las instituciones con incumplimiento para garantizar la calidad y completitud de la información en la vigilancia de IAD en población pediátrica.

Indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de IAD en UCI Pediátrica por UPGD, enero a abril año 2026

Fuente: SIVIGILA WEB

Desde un enfoque epidemiológico, el indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de infecciones asociadas a dispositivos (IAD) en UCI neonatal por UPGD durante enero a abril de 2026 muestra un comportamiento generalmente adecuado, con cumplimiento del 100%. En conjunto, aunque el sistema de vigilancia muestra fortaleza en la mayoría de las UPGD, estas inconsistencias evidencian la necesidad de fortalecer el monitoreo, la asistencia técnica y la verificación de la calidad del dato para asegurar la completitud y oportunidad en la notificación de IAD en UCI neonatal.

Indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de IAD en UCI Neonatal por UPGD, enero a abril año 2026

Fuente: SIVIGILA WEB

2.13.2 Infecciones Asociadas a Procedimientos Médico Quirúrgicos (IAPMQ)

Hasta la semana epidemiológica 21 de 2026, se han notificado al SIVIGILA 47 casos de Infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos a diferencia del año 2025 donde se presentaron 44 casos, lo cual representa un incremento de 7%.

CÓDIGO


VERSIÓN**FECHA DE APROBACIÓN**

PÁGINA

87 de 105

Desde un enfoque epidemiológico, la distribución de las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos (IAPMQ) notificadas en Santander durante 2026 muestra un claro predominio de la cesárea, que concentra el 62% del total de casos (24), seguida del parto vaginal con 21% (8), lo que evidencia una mayor carga de eventos asociados a procedimientos obstétricos. En menor proporción se encuentran la herniorrafia y la colecistectomía, cada una con 8% (3 casos), y la revascularización miocárdica (RVM) con 3% (1 caso), reflejando una menor frecuencia en procedimientos quirúrgicos no obstétricos. Por comportamiento mensual, enero y marzo concentran el mayor número de casos, especialmente en cesáreas, mientras que febrero presenta un aumento relativo en parto vaginal. En cuanto a abril, se observa un bajo número de notificaciones (2 casos en total), lo cual debe interpretarse con cautela debido a que el mes está en curso y existe rezago en la notificación. En conjunto, estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer las estrategias de prevención de infecciones en procedimientos obstétricos, particularmente en cesáreas, sin descuidar la vigilancia en otros procedimientos quirúrgicos como la revascularización miocárdica.

Porcentaje de IAPMQ notificados en Santander, según procedimiento y mes año 2026



Fuente: SIVIGILA WEB

Desde un enfoque epidemiológico, el comportamiento social y demográfico de los casos de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos (IAPMQ) en Santander durante las semanas epidemiológicas 1 a 21 de 2026 muestra un claro predominio en el sexo femenino (92%), lo cual se explica principalmente por la inclusión de procedimientos obstétricos como cesárea y parto vaginal, que concentran la mayor proporción de casos. En cuanto al régimen de afiliación, se observa mayor frecuencia en el régimen contributivo (46%) y subsidiado (41%), lo que sugiere una distribución acorde con la cobertura del sistema de salud, aunque con ligera

mayor carga en población asegurada. Por grupos de edad, la mayor concentración de casos se presenta en mujeres en edad reproductiva, especialmente entre 15 y 29 años (67% acumulado), en coherencia con la alta proporción de eventos asociados a procedimientos obstétricos; mientras que en edades mayores (>60 años) los casos corresponden principalmente a procedimientos quirúrgicos no obstétricos como herniorrafia, colecistectomía y revascularización miocárdica. En los hombres (8%), los eventos son poco frecuentes y están asociados exclusivamente a procedimientos quirúrgicos generales y cardiovasculares. En conjunto, el perfil evidencia que la carga de IAPMQ está fuertemente influenciada por la atención materna, por lo que es clave fortalecer las estrategias de prevención de infecciones en el contexto obstétrico, sin descuidar otros grupos poblacionales y procedimientos.

Comportamiento Social y Demográfico de los casos de LAPMQ en Santander, semanas epidemiológicas 1-21, año 2026

Variable	Categoría	Cesárea	%	Herniorrafia	%	Parto vaginal	%	Revascularización miocárdica con incisión torácica y del sitio donante	%	Colecistectomía	%	Total	%
Sexo	Femenino	24	62%	1	2,6%	8	21%	0	0,0%	3	7,7%	36	92%
	Masculino	0	0%	2	5,1%	0	0%	1	2,6%	0	0,0%	3	8%
Régimen de Seguridad Social	Contributivo	13	33%	1	2,6%	2	5%	0	0,0%	2	5,1%	18	46%
	Indeterminado	1	3%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3%
	No Asegurado	1	3%	0	0,0%	1	3%	0	0,0%	0	0,0%	2	5%
	Excepción	0	0%	0	0,0%	0	0%	1	2,6%	1	2,6%	2	5%
	Subsidiado	9	23%	2	5,1%	5	13%	0	0,0%	0	0,0%	16	41%
Grupos de edad	0-4	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	5-9	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	10-14	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	15-19	5	13%	0	0,0%	4	10%	0	0,0%	0	0,0%	9	23%
	20-24	7	18%	0	0,0%	2	5%	0	0,0%	0	0,0%	9	23%
	25-29	6	15%	0	0,0%	2	5%	0	0,0%	0	0,0%	8	21%
	30-34	4	10%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	4	10%
	35-39	2	5%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	2	5%
	40-44	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	45-49	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	50-54	0	0%	1	2,6%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3%
	55-60	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	1	2,6%	1	3%
	>60	0	0%	2	5,1%	0	0%	1	2,6%	2	5,1%	5	13%

Fuente: SIVIGILA WEB

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	88 de 105

Incidencia de las Infecciones Asociadas a Procedimientos Médico Quirúrgicos por procedimiento en Santander, enero a abril año 2026

Fuente: SIVIGILA WEB

Principales agentes causales asociados a IAPMQ en Santander, semanas epidemiológicas 1-21, año 2026

Fuente: SIVIGILA

Entre enero y abril de 2026, el cumplimiento de la notificación colectiva de Infecciones Asociadas a Procedimientos Médico-Quirúrgicos (IAPMQ) en Santander mostró un desempeño favorable, con la mayoría de las UPGD realizando el reporte oportuno durante los cuatro meses evaluados. Se destaca el cumplimiento del 100% en instituciones de municipios como Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca, Lebrija, Málaga, Piedecuesta, San Gil y Socorro. Sin embargo, se identificaron UPGD con cumplimiento parcial del 75%, debido a la ausencia de reporte en uno o más meses, entre ellas el ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa, Clínica Revivir, IPS Cabecera, ESE Hospital San Rafael de Concepción y el ESE Hospital San Pedro Claver de Mogotes. Llama la atención el incumplimiento total (0%) del ESE

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	89 de 105

Indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de IAPMQ por UPGD, enero a abril año 2026

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	%
BARBOSA	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO	1	0	1	1	75%
BARRANCABERMEJA	CLINICA REINA LUCIA SAS	1	1	1	1	100%
	DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO ECOPETROL	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO	1	1	1	1	100%
	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	1	1	1	1	100%
	UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA	1	1	1	1	100%
BUCARAMANGA	BATALLÓN DE ASPC NO5 HOSPITAL MILITAR BUCARAM	1	1	1	1	100%
	CLINICA CHICAMOCHA SA	1	1	1	1	100%
	CLINICA ESPCO-DESAN	1	1	1	1	100%
	CLINICA GESTIONAR BIENESTAR	1	1	1	1	100%
	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	1	1	1	1	100%
	CLINICA REVIVIR SA	1	1	0	1	75%

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	%
	CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL LOCAL DEL NORTE	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1	1	1	1	100%
	IPS CABECERA SAS	1	1	1	0	75%
	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANG	1	1	1	1	100%
	SEDE GONZALEZ VALENCIA	1	1	1	1	100%
	UIMIST	1	1	1	1	100%
CHARALA	ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARAL	1	0	0	0	25%
CONCEPCION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL	1	1	1	0	75%
FLORIDABLANCA	ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTERAL DE SALUD	1	1	1	1	100%
	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	1	1	1	1	100%
	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	1	1	1	1	100%
	FUNDACION FOSUNAB	1	1	1	1	100%
	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	1	1	1	1	100%
LEBRIJA	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE LEBR	1	1	1	1	100%
MALAGA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	1	1	1	1	100%
MOGOTES	ESE HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER DE MOGOTES SANTANDER	1	1	1	0	75%
PIEDECUESTA	CLINICA PIEDECUESTA SA	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	100%
	INSTITUTO CARDIOVASCULAR SEDE AMBULATORIA	1	1	1	1	100%

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	92 de 105

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	%
ALBANIA	ESE BLANCA ALICIA HERNANDEZ	0	0	0	0	0%
BARBOSA	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO	1	1	0	1	75%
BARRANCABERMEJA	CENTRO DE SALUD CON CAMAS CASTILLO	1	1	1	1	100%
	CENTRO DE SALUD CON CAMAS ELCENTRO	1	1	1	1	100%
	CENTTRO DE SALUD CON CAMAS EL DANUBIO	1	1	1	1	100%
	CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS	1	1	1	1	100%
	CLINICA REINA LUCIA SAS	1	1	1	1	100%
	DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO ECOPETROL	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO	1	1	1	1	100%
	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	1	1	1	1	100%
	UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA	1	1	1	1	100%
	BUCARAMANGA	BATALLÓN DE ASPC NO5 HOSPITAL MILITAR BUCARAM	1	1	1	1
CENTRO MEDICO QUIRURGICO LA RIVIERA SAS		1	1	1	1	100%
CLINICA CHICAMOCHA SA		1	1	1	1	100%
CLINICA CHICAMOCHA SEDE CONUCOS		1	1	1	1	100%
CLINICA ESPCO-DESAN		1	1	1	1	100%
CLINICA GESTIONAR BIENESTAR		1	1	1	1	100%
CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA		1	1	1	1	100%

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	%
	CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL LOCAL DEL NORTE	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1	1	1	1	100%
	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANG	1	1	1	1	100%
	MESSER COLOMBIA SA AGENCIA REMEO CENTER BUCARAMANG	1	1	1	1	100%
	SEDE GONZALEZ VALENCIA	1	1	1	1	100%
	UIMIST	1	1	1	1	100%
	CERRITO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO	0	0	0	0
CHARALA	ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARAL	1	0	0	0	25%
CONCEPCION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL	1	1	1	1	100%
FLORIDABLANCA	ESE CLÍNICA GUANE Y SU RED INTERAL DE SALUD	1	1	1	1	100%
	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	1	1	1	1	100%
	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	1	1	1	1	100%
	FUNDACION FOSUNAB	1	1	1	1	100%
	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	1	1	1	1	100%
GIRON	CLINICA GIRON ESE	1	1	1	1	100%
GUACA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA	1	1	1	0	75%
LA BELLEZA	ESE HOSPITAL SAN MARTIN LA BELLEZA	1	1	1	1	100%
LEBRIJA	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE LEBR	1	1	1	1	100%


nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	%
MALAGA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	1	1	1	1	100%
MOGOTES	ESE HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER DE MOGOTES SANTANDER	1	1	1	0	75%
OIBA	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	0	1	1	0	50%
PIEDRECUESTA	CLINICA PIEDECUESTA SA	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	100%
PUENTE NACIONAL	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO	1	0	1	1	75%
SAN GIL	CLINICA FOSCAL SANTA CRUZ DE LA LOMA	1	1	1	1	100%
	ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL	1	1	1	1	100%
SOCORRO	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	1	1	1	1	100%
SUCRE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	1	1	1	1	100%
VELEZ	ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ	0	0	0	0	0%
ZAPATOCA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA	0	0	0	0	0%

Fuente: SIVIGILA WEB


República de Colombia  Gobernación de Santander	BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL	CÓDIGO	MI-GS-RG-537
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
		PÁGINA	97 de 105

POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD: Nº. Casos: 220


Pirámide poblacional




Distribución de casos en PPL por zona de residencia




Casos notificados en PPL según Régimen de Afiliación




Condición final de casos notificados en PPL



Eventos de interés en salud pública notificados en PPL




Reclusorios que notificaron casos en PPL






República de Colombia  Gobernación de Santander	BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL	CÓDIGO	MI-GS-RG-537
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
		PÁGINA	98 de 105

POBLACIÓN CON PERTENENCIA ÉTNICA: Nº. Casos: 94




POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: N°. Casos: 73



República de Colombia  Gobernación de Santander	BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL	CÓDIGO	MI-GS-RG-537
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
		PÁGINA	101 de 105


POBLACIÓN EN CENTROS PSIQUIÁTRICOS: N.º. Casos: 172




 República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander	BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL	CÓDIGO	MI-GS-RG-537
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
		PÁGINA	103 de 105

POBLACIÓN INFANTIL A CARGO DEL ICBF: N°. Casos: 41


Pirámide poblacional




Distribución de casos en Población infantil a cargo del ICBF por zona de residencia




Casos notificados en Población infantil a cargo del ICBF según Régimen de Afiliación



Condición final de casos notificados en Población infantil a cargo del ICBF



Eventos de interés en salud pública notificados en Población infantil a cargo del ICBF




Mun. de residencia de casos not. en Población infantil a cargo del ICBF




República de Colombia  Gobernación de Santander	BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL	CÓDIGO	MI-GS-RG-537
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
		PÁGINA	104 de 105

POBLACIÓN DESPLAZADOS: N°. Casos: 29


Pirámide poblacional




Distribución de casos en Población desplazada por zona de residencia




Casos notificados en población desplazada según Régimen de Afiliación



Condición final de casos notificados en Población desplazada



Eventos de interés en salud pública notificados en Población desplazada



Mun. de residencia de casos not. en Población desplazada



	BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL	CÓDIGO	MI-GS-RG-537
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
		PÁGINA	105 de 105

FICHA TÉCNICA

Con base en la información reportada al Sistema de vigilancia - SIVIGILA, con corte a la semana epidemiológica 21 de 2026, se realizó un análisis descriptivo de los casos notificados en la variable “grupo poblacional”. El objetivo de este análisis es caracterizar el contexto demográfico de los casos, considerando su distribución por edad, sexo, zona de residencia (cabecera municipal, centro poblado y rural disperso), régimen de afiliación al sistema de salud y condición final (vivo o fallecido). Asimismo, se incluyen los eventos de interés en salud pública y la distribución de los casos según el municipio de residencia de las personas notificadas.

Boletín Epidemiológico
Secretaría de Salud de Santander

Alexander Torres Prieto
Coordinador Grupo Epidemiología y demografía

Diana Patricia Ariza Diaz
Profesional universitaria, Grupo Epidemiología y demografía

Referentes de los eventos
Duby Quiñonez Carreño
Xiomara Chanagá Vera
Juliana Monsalve Sarmiento
Olga L. Jiménez Abaunza
Fabiola Andrea Mayorga Pineda

Daynner Vacca Lascarro
Lilibeth López Moreno
Karent Duran Rondón
Leonardo Silva Rueda
Sonia Luz Gómez Garcés
Mayra Alejandra Contreras Parra
Paola A. Suárez Suárez
Leonor Eloisa Araujo Arias
Laura Viviana Quintero Ardila
Lady Johana Mateus Pineda

Consolidado:
Paola A. Suárez Suárez
Publicación: Grupo de Epidemiología y Demografía SSS