



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	2 de 112


✓ **Proporción de casos notificados oportunamente**

El **59% (52/87)** de los municipios notificó al menos un evento objeto de vigilancia en salud pública oportunamente a semana **28**.

✓ Oportunidad en la notificación por evento

Respecto a la oportunidad en la notificación por evento, es importante insistir en los reportes en los tiempos definidos según el evento.

Oportunidad Notificación eventos interés en salud pública S.E. **28** Santander de **2026**.




Fuente de los datos: SIVIGILA

La gráfica evidencia un alto compromiso en la notificación de la mayoría de los eventos de interés en salud pública, pero también señala brechas críticas en Infección Respiratoria Aguda Grave Irregular y Dengue Grave, que requieren acciones inmediatas para garantizar la calidad y oportunidad de la vigilancia epidemiológica.

✓ Reporte Notificación Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) Sem. 28

Durante la semana epidemiológica **28**, se evidencia un cumplimiento en la notificación del evento de Infección Respiratoria Aguda (IRA) por parte de las entidades territoriales, con un promedio general de **98%** de cumplimiento. Del total de los 87 municipios, **83 (95%)** alcanzaron un cumplimiento del 100% en la notificación, evidenciando una adecuada adherencia a los lineamientos del sistema de vigilancia en salud pública. No obstante, **4** municipios no lograron el cumplimiento total, lo que sugiere la necesidad de fortalecer las acciones orientadas a mejorar la oportunidad y calidad de la notificación.


Oportunidad en la notificación de IRA S.E 28 de 2026.



Fuente de los datos: SIVIGILA




✓ Reporte Notificación Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) Sem. 28

Oportunidad en la notificación de EDA S.E **28 de 2026.**


✓ Cumplimiento en el Ajuste De Casos

Ajustes pendientes S.E. 28 Santander de 2026




Fuente de los datos: SIVIGILA

El comportamiento del indicador sugiere que existen debilidades en la gestión del ajuste en eventos prioritarios, especialmente aquellos con mayor carga o relevancia epidemiológica.

Ajustes pendientes por Municipios S.E. **28** Santander de **2026**.

✓ Oportunidad en el ajuste de casos

Oportunidad en Ajustes S.E. **28** Santander de **2026**..





CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	5 de 112

Durante la semana epidemiológica **28 de 2026.**, la oportunidad en el ajuste de los eventos de vigilancia en salud pública muestra un comportamiento favorable, evidenciado en un alto porcentaje de casos clasificados como oportunos.

Del total de registros analizados, el **84%** de los casos fueron ajustados de manera oportuna, y un **15%** de casos inoportunos, lo que indica demoras en el ajuste de algunos eventos

1.3. NOTIFICACION NEGATIVA

La Notificación negativa debe ser utilizada bajo la premisa “se realizó la búsqueda de casos en la semana y no se encontraron casos”, no puede ser utilizado como mecanismo para cumplimiento en el reporte, es por esta razón que es necesario la revisión de la notificación negativa de UPGD, las cual no podrá ser superior a la proporción de semanas positivas, razón por la cual se hace necesario la revisión de los reportes de las siguientes UPGDS.

Tabla 1. Notificación Negativa Individual Sem **28**

MUNICIPIO	UPGD	Notificaciones Negativas
BUCARAMANGA	CLINICA REVIVIR SA	28
MALAGA	ESTABLECIMIENTO PRIMARIO DE SANIDAD MALAGA	28
PUERTO WILCHES	SALUD DIAGNOSTICA SAS	28
PUERTO WILCHES	SALUDMAG IPS SAS	28
FLORIDABLANCA	UNIDAD MEDICA CLINICA EL LAGO	26
SAN GIL	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD PRIMARIO SAN GIL	26
BARRANCABERMEJA	UNIDAD DE ATENCION BASICA MILITAR BARRANCABERMEJA	24
PUENTE NACIONAL	FUNDACION AVANZAR FOS PUENTE NACIONAL	24
SABANA DE TORRES	SALUD FAMILIA SABANA DE TORRES	23
PUERTO WILCHES	REDINSALUD PW	22
BUCARAMANGA	CENTRO MEDICO SINAPSIS IPS SA	21
HATO	PUERTO DE SALUD DEL HATO	21
BARRANCABERMEJA	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIA NACIONAL BARRAN	20
EL GUACAMAYO	ESE CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI	20
SANTA HELENA DEL OPON	ESE CENTRO DE SALUD JAIME MICHEL	20
CALIFORNIA	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CALIFORNIA	19
SANTA BARBARA	ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA	19
PALMAR	ESE ANDRES CALA PIMENTEL	17
GUAPOTA	ESE SAN CAYETANO GUAPOTA	16
COROMORO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO COROMORO	15
COROMORO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO COROMORO	15
FLORIDABLANCA	CIRO EDUARDO LOPEZ BAUTISTA	15
SAN MIGUEL	ESE CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL	15

Fuente de los datos: SIVIGILA



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	7 de 112

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026.

Durante las semanas epidemiológicas 01 a 28 de 2026 se notificaron 30 casos probables y confirmados de meningitis bacteriana aguda y enfermedad meningocócica. El 50,0 % (n=15) correspondió a hombres y el 50,0 % (n=15) a mujeres. El 83,33 % (n=25) de los casos residía en cabecera municipal y el 16,67 % (n=5) en área rural dispersa. El 80,0 % (n=24) de los casos se encontraba vivo al cierre de la información. Predominó el régimen subsidiado (63,33 %; n=19), seguido del contributivo (30,0 %; n=9). La mayor proporción de casos se concentró en personas de 60 años y más (40,0 %; n=12), seguidas del grupo de 50 a 59 años (20,0 %; n=6) y de 30 a 49 años (16,67 %; n=5).

A la fecha, no se reporta nexo epidemiológico, temporal ni espacial entre los casos, ni se han identificado alertas asociadas al evento.

Casos de meningitis bacteriana aguda y enfermedad meningocócica, según entidad territorial de procedencia. Santander, SE 01 – 28, 2026.

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026. Nm: *Neisseria meningitidis*, Spn: *Streptococcus pneumoniae*
Hi: *Haemophilus influenzae*, Otros: otros agentes bacterianos.

Distribución sociodemográfica de los casos probables y confirmados de meningitis bacteriana aguda y enfermedad meningocócica, SE 01 – 28, 2026

Variables		N° casos	%
Sexo	Masculino	17	54,84%
	Femenino	14	45,16%
Área	Cabecera m/pal	26	83,87%
	Rural Disperso	4	12,90%
	Centro Poblado	1	3,23%
Condicion Final	Vivo	24	77,42%
	Muerto	7	22,58%
Tipo SS	Subsidiado	17	54,84%
	Contributivo	9	29,03%



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	8 de 112

	Excepcion	3	9,68%
	No asegurado	2	6,45%
Rango de edad	< 1 año	3	9,68%
	1-4	1	3,23%
	5-9	2	6,45%
	10-14	1	3,23%
	30-39	3	9,68%
	40-49	4	12,90%
	50-59	5	16,13%
	60-69	7	22,58%
	70 y mas	5	16,13%
Total	31		


Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026.

2.1.3 Parálisis Flácida Aguda (PFA)

A la semana epidemiológica 28 de 2026 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 6 casos probables de parálisis flácida aguda procedentes de Santander. De estos, 3 casos (50 %) corresponden a la vigilancia rutinaria en menores de 15 años y 3 casos (50 %) a la vigilancia centinela en personas de 15 a 39 años.

Al corte de la semana epidemiológica 28, en la vigilancia rutinaria se registra un caso probable (33%) y 2 casos descartados (66 %); en la vigilancia centinela se registra 3 casos descartados (100 %). El caso que permanece probable corresponde a una menor de sexo femenino, residente en cabecera municipal, afiliada al régimen contributivo, con condición final viva y perteneciente al grupo de edad de 1 a 4 años. En comparación, para el año 2025, con corte a la SE 28, se notificaron dos (2) caso de parálisis flácida aguda con procedencia en el departamento, que fueron descartados.

**Comportamiento según histórico de casos notificados de Parálisis Flácida Aguda.
Santander. SE 01- 28, 2017-2026.**



Fuente: Sivigila-secretaria de salud de Santander, 2026

De acuerdo con el comportamiento histórico del evento, para la SE 28 de 2026 la notificación de parálisis flácida aguda se ubica por debajo de lo esperado para el periodo evaluado. Con corte a la SE 28, no se han confirmado casos, la incidencia del evento fue de 0 casos por cada 100.000 menores de 15 años. En el contexto del seguimiento a la meta de erradicación/eliminación del poliovirus, la tasa de notificación de parálisis flácida aguda en el departamento se ubicó en 0,61 casos por cada 100.000 menores de 15 años. A la fecha, no se ha identificado casos confirmados, brote, ni se han notificado alertas asociadas al evento.


2.1.4 Parotiditis

A semana epidemiológica 28 de 2026, se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 48 casos de parotiditis procedentes del departamento de Santander. El 100 % de los casos corresponden a casos confirmados por clínica.



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	9 de 112

Comportamiento según histórico de casos de Parotiditis. Santander, SE 01-28, 2016-2026.



Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

De acuerdo con el comportamiento histórico del evento, para la semana epidemiológica 28 de 2026 la notificación de parotiditis se encuentra por debajo de lo esperado para el periodo evaluado, con fluctuaciones entre semanas y sin evidenciar una tendencia sostenida.

La incidencia de parotiditis en la población general del departamento de Santander, con corte a la semana epidemiológica 28 de 2026, es de 2,05 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Según la entidad territorial de procedencia, a la semana epidemiológica 28 de 2026, los casos de parotiditis se concentraron principalmente en Bucaramanga 52,08% seguida de Floridablanca, Barrancabermeja y Piedecuesta.

Casos de parotiditis notificados, según entidad territorial de procedencia, Santander.
SE 01-28, 2026.

Municipio	Casos	%	Incidencia Pob. General
Bucaramanga	25	52,08%	4,01
Floridablanca	5	10,42%	1,58
Piedecuesta	5	10,42%	2,66
Barrancabermeja	4	8,33%	1,85
Giron	2	4,17%	1,13
Aratoca	1	2,08%	11,48
Barbosa	1	2,08%	2,98
Florian	1	2,08%	17,44
Guadalupe	1	2,08%	21,82
Malaga	1	2,08%	4,50
Puerto Wilches	1	2,08%	2,85
Villanueva	1	2,08%	12,21
SANTANDER	48	1	2,05

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

En cuanto a las características sociodemográficas, predominó el sexo femenino 54,17% y el área de ocurrencia es cabecera municipal 91,67%. El 100 % de los casos presentó condición final viva. Por tipo de aseguramiento, predominó el régimen subsidiado 58,33%, seguido del contributivo 22,92%. Los casos se concentraron principalmente en los grupos de 1 a 4 años 16,67%, de 5 a 9 años 16,67%, y 50 a 59 años 12,96%.





República de Colombia

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	18 de 112



República de Colombia

DEPARTAMENTO DE SANTANDER


Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	18 de 112

El grupos de edad con mayor notificación de este evento es 20 a 29 años con 16.45% para ambos sexos .


Pirámide por grupo de Edad y Sexo, Santander, semanas epidemiológicas 01- 28, 2026



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

En referencia al comportamiento Inusual de las AAPTR, se evidencia un incremento en los municipios: Confines, el Carmen De Chucuri, Galan, Jordan Sube, La Paz, Palmar, Palmas del Socorro, San Benito, Socorro.

Mapa, de Comportamiento Inusual de las AAPTR, Santander, semanas epidemiológicas 01-28, 2026




Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	20 de 112


Casos Leptospirosis, Santander, Semanas epidemiológicas 01- 28, 2025-2026



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

Los municipios con mayor incidencia de casos probables de leptospirosis según procedencia son: Vélez, Jesús María, Puente Nacional, Bolívar, Albania, san Andrés, La paz, Güepsa, Paramo, Matanza, , La incidencia del los casos Confirmados de Leptospira para Santander es 5.23 casos/100.000 habitantes.

Incidencia de Leptospirosis por municipio de procedencia. Santander, semanas epidemiológicas 01- 28, 2026




Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	25 de 112

Canal endémico de los Servicios de Consulta externa y urgencias para el Evento de IRA, Santander SE 28 año 2026



Para la semana epidemiológica 27 de 2026, se identificó incremento en las consultas externas y atenciones de urgencias por IRA en varios municipios del departamento, principalmente en el Área Metropolitana de Bucaramanga y municipios de las provincias de Soto Norte, Guantán, y Vélez. Aunque se observa aumento en la notificación, el comportamiento general del evento continúa dentro de los parámetros esperados para la época, por lo que se mantiene el seguimiento epidemiológico permanente para la detección oportuna de cambios en la tendencia del evento

Mapa de comportamiento Inusual de la IRA en población del departamento de Santander.



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

								CÓDIGO	MI-GS-RG-537
								VERSIÓN	1
								FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
								PÁGINA	29 de 112

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

Puerto Parra	4	2	1	0	0	7	0,2%	76,5
Malaga	6	0	1	0	0	7	0,2%	28,7
Bolivar	4	0	1	0	0	5	0,1%	43,2
Puente Nacional	2	1	2	0	0	5	0,1%	32,6
San Andres	1	1	3	0	0	5	0,1%	57,0
Santa Helena del Opon	3	1	1	0	0	5	0,1%	143,8
Betulia	3	0	1	0	0	4	0,1%	58,1
Concepcion	3	1	0	0	0	4	0,1%	65,5
Capitanejo	1	1	1	0	0	3	0,1%	47,4
Curiti	2	0	1	0	0	3	0,1%	20,3
Florian	3	0	0	0	0	3	0,1%	52,6
Galan	2	0	0	0	0	2	0,0%	65,3
Sucre	2	0	1	0	0	3	0,1%	40,7
Gambita	2	0	0	0	0	2	0,0%	48,5
Guapota	2	0	0	0	0	2	0,0%	75,0
La Paz	2	0	0	0	0	2	0,0%	39,4
Paramo	1	1	0	0	0	2	0,0%	35,3
Pinchote	1	0	1	0	0	2	0,0%	32,4
San Miguel	2	0	0	0	0	2	0,0%	75,0
Simacota	2	0	0	0	0	2	0,0%	17,0
Valle de San Jose	2	0	0	0	0	2	0,0%	27,8
California	1	0	0	0	0	1	0,0%	39,4
Charta	0	0	1	0	0	1	0,0%	30,1
Confines	1	0	0	0	0	1	0,0%	26,9
Contratacion	0	0	1	0	0	1	0,0%	23,5
El Guacamayo	1	0	0	0	0	1	0,0%	45,13
Guadalupe	0	0	1	0	0	1	0,0%	21,62
Guavata	1	0	0	0	0	1	0,0%	23,17
Matanza	1	0	0	0	0	1	0,0%	17,46
Ocamonte	1	0	0	0	0	1	0,0%	15,08
Palmas Socorro	0	0	1	0	0	1	0,0%	35,54
Tona	1	0	0	0	0	1	0,0%	11,73
San Jose de Miranda	1	0	0	0	0	1	0,0%	22,54
Santa Barbara	1	0	0	0	0	1	0,0%	37,45
Surata	0	0	1	0	0	1	0,0%	21,92
Santander	2467	172	1338	3	24	4004	100%	166,1

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

El análisis de los indicadores de confirmación y hospitalización a semana 28 según el municipio de notificación de los casos de dengue con signos de alarma y dengue grave para Santander registra, que sólo el 89,0% de los casos con signos de alarma y el 100,0% de los casos de dengue grave han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio o nexó epidemiológico. Para el indicador de hospitalización el 84,9% de los casos con signos de alarma y el 100,0% de los casos de dengue grave se han hospitalizado.

Porcentaje de confirmación-hospitalización, municipio de notificación. Santander, S.E.1-28, 2026

Municipio Notificador	Casos (n)		Confirmación (%)		Hospitalización (%)	
	Con signos de alarma	Grave	Con signos de alarma	Grave	Con signos de alarma	Grave
Bucaramanga	787	19	88,1%	100,0%	87,5%	100,0%
Barrancabermeja	230	2	95,7%	100,0%	96,5%	100,0%
Piedecuesta	137	4	91,2%	100,0%	86,1%	100,0%
Floridablanca	200	6	99,5%	100,0%	99,0%	100,0%
San Vicente de Chucuri	34	0	97,1%		32,4%	
Cimitarra	32	0	71,9%		75,0%	
Puerto Wilches	12	0	100,0%		83,3%	
Sabana de Torres	39	0	43,6%		7,7%	
San Gil	26	0	92,3%		96,2%	
Giron	13	0	84,6%		7,7%	
Velez	29	0	93,1%		96,6%	
El Playon	9	0	77,8%		77,8%	
Barbosa	3	0	0,0%		0,0%	
Lebrija	5	0	60,0%		40,0%	
Betulia	1	0	100,0%		100,0%	
Concepcion	1	0	0,0%		0,0%	
Chipata	1	0	0,0%		0,0%	
Zapatoca	2	0	0,0%		0,0%	
Oiba	1	0	100,0%		100,0%	
Landazuri	1	0	100,0%		0,0%	
Contratacion	1	0	100,0%		100,0%	
El Carmen de Chucuri	9	0	55,6%		11,1%	
Arato ca	4	0	100,0%		0,0%	
Socorro	9	0	100,0%		100,0%	
Malaga	4	0	75,0%		75,0%	
Puerto Parra	1	0	0,0%		0,0%	
Puente Nacional	1	0	100,0%		0,0%	
Rionegro	3	0	66,7%		66,7%	



República de Colombia

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	30 de 112

Los Santos	1	0	0,0%		0,0%	
Paramo	1	0	0,0%		100,0%	
Barichara	1	0	100,0%		0,0%	
San Andres	1	0	0,0%		100,0%	
Santander	1599	31	89,0%	100,0%	84,9%	100,0%

2.3.1.2 Mortalidad por Dengue

2.3.1.3 Chikungunya

2.3.1.4 Zika

2.3.2 Malaria

Malaria por municipio de procedencia. Santander, S.E. 1-28, 2026

A semana epidemiológica 28, en el departamento de Santander se han notificado 55 casos de Malaria, entre los cuales la oportunidad de diagnóstico, menor a 2 días, se registra para el departamento sólo en el 7,3% de los casos; y la oportunidad de tratamiento, menor a 24 horas, para el departamento se encuentra en el 65,5% de los casos. En cuanto a la hospitalización de malaria complicada para el departamento de Santander, se registra en el 100,0% de los 8 casos notificados.

2.3.3 Fiebre Amarilla



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	31 de 112

Según el análisis de comportamientos inusuales, **14 municipios** del departamento registran un **incremento significativo** de casos de Leishmaniasis cutánea, en comparación con el comportamiento histórico de los últimos cinco años (**Albania, Betulia, Bolívar, Contratación, El Carmen de Chucurí, El Peñón, El Playón, Florián, Landázuri, Lebrija, Rionegro, Santa Helena del Opón, Sucre y Vélez**). Por el contrario, **cinco municipios** registran **decremento significativo** (**Cimitarra, La Belleza, Sabana de torres, San Benito y San Vicente de Chucurí**). Los **68 municipios** restantes **no presentan cambios significativos** en el comportamiento. El **Departamento de Santander** registra 13 semanas consecutivas en **incremento significativo** de casos para este evento **teniendo en cuenta el histórico de los últimos 5 años**.



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	32 de 112


Características sociodemográficas de Leishmaniasis Cutánea. Santander, SE 1-28, 2026.

Variable		Nº de casos	%	Incidencia
Sexo	Femenino	210	39,1%	58,3
	Masculino	327	60,9%	90,8
Área de ocurrencia	Cabecera municipal	17	3,2%	0,9
	Centro poblado y Rural disperso	520	96,8%	93,8
Tipo de Seguridad Social	Subsidiado	414	77,1%	35,8
	Contributivo	86	16,0%	7,8
	Excepción y Especiales	22	4,1%	30,2
	Indeterminado	4	0,7%	
	No asegurado	11	2,0%	
Curso de vida / Grupos de edad	Primera infancia 0 a 5 años	50	9,3%	161,6
	Infancia 6 a 11 años	56	10,4%	154,8
	Adolescencia 12 a 17 años	71	13,2%	184,3
	Juventud 18 a 28 años	120	22,3%	182,4
	Adultez 29 a 59 años	198	36,9%	128,6
	Vejez Mayores de 60 años	42	7,8%	68,5
TOTAL		537	100%	138,9

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Los municipios con mayor proporción de casos notificados son **El Carmen de Chucurí 23,3% (125 casos)**, **El Playón 13,8% (74 casos)**, **Landázuri 12,7% (68 casos)**, **Rionegro 8,4% (45 casos)** y **Santa Helena del Opón 6,7% (36 casos)**.

Incidencia de Leishmaniasis Cutánea por municipio de Procedencia. Santander, SE 1-28, 2026.



Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

El municipio de **Santa Helena del Opón** registra la mayor incidencia con **1426,9 casos por cada 100.000 habitantes a riesgo**, seguido de **El Playón** con **1085,4 casos por cada 100.000 habitantes a riesgo** y **Landázuri** con **985,2 casos por cada 100.000 habitantes a riesgo**.

El departamento de **Santander** registra una incidencia de **149,1 casos por cada 100.000 habitantes a riesgo.**

2.3.5.1 Chagas Agudo

Hasta la semana epidemiológica 28 de 2026 se registran 10 casos de **Chagas Agudo (dos casos confirmados y ocho casos probables)**, procedentes de Santander.

Los dos **casos confirmados** corresponden a casos por **reactivación** procedentes del municipio de **Bucaramanga (1) y Oiba (1)**.

Los **ocho casos probables** corresponden a **casos congénitos en estudio**.

Comportamientos inusuales Chagas Agudo. Santander, S.E. 1-28, 2026

Chagas Agudo Confirmado	Esperado SE 28	Observado SE 28	Comportamiento	Variación
	1	2	Sin Cambio Significativo	100%

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

El análisis de comportamientos inusuales **no registra cambio significativo** en la notificación de **Chagas Agudo** para el **Departamento de Santander**.

Hasta la semana epidemiológica 28 de 2026 **no se registran mortalidades por Chagas Agudo** en el Departamento de Santander.

Casos de Chagas Agudo por vía de transmisión y Clasificación. Santander, SE 1-28, 2026.


Vía de transmisión	Casos			Proporción de casos con pruebas parasitológicas	Letalidad por Chagas agudo
	Probables	Confirmados	Total		
Vectorial	0	2	2	100%	0%
Oral	0	0	0		
Transfusional	0	0	0		
Trasplante	0	0	0		
Accidentes de laboratorio	0	0	0		
Congénito	8	0	8	100%	0%
Total	8	2	10	100%	

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Se notificaron **ocho casos de Chagas Agudo probables congénitos** con procedencia **Floridablanca (4), Bucaramanga (1), Girón (1), Mogotes (1) y Sabana de torres (1)**.



**Chagas crónico en Gestantes por municipio de procedencia, Santander.
S.E. 1-28, 2026.**



Los municipios con mayor número de casos crónicos notificados son **San Gil (16 casos)**, **Mogotes (11 casos)**, **Floridablanca** y **Bucaramanga (8 casos cada uno)**.

Los **12** casos de **Chagas crónico** en gestantes proceden de los municipios de **Cimitarra** (cuatro casos), **Barrancabermeja** (un caso), **Curití** (un caso), **El Peñón** (un caso), **Florián** (un caso), **Girón** (un caso), **Piedecuesta** (un caso), **San Gil** (un caso) y **Simacota** (un caso).

De los 12 casos crónicos en gestantes, **cinco casos** se encuentran **confirmados** y **siete casos probables**. Se recuerda que los hijos de gestantes positivas para Chagas (tanto probables y confirmadas) deben quedar en seguimiento desde el momento del nacimiento y hasta los 10 meses de edad.

Casos de Chagas crónico en gestantes por periodo de gestación y clasificación, Santander. SE 1-28, 2026.			
Periodo de Gestación	Total Casos	Casos Confirmados	Casos Probables (Segunda prueba pendiente - ELISA Ag recombinantes)
Trimestre I	0	0	0
Trimestre II	5	2	3
Trimestre III	3	1	2
Embarazo a término y Post parto	4	2	2
Total	12	5	7

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	38 de 112

2.4 FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE

2.4.1 Intoxicaciones por Sustancias Químicas

A semana epidemiológica 28 de 2026 se han notificado al SIVIGILA 457 casos de intoxicaciones por sustancias químicas (11 casos en la última semana); en el mismo periodo epidemiológico de 2025 se notificaron 314 casos. Semanalmente el número de casos notificados se ajusta debido a la notificación tardía del evento, a ajustes y a depuración por calidad del dato., se realiza cruce de base de datos con intento de suicidio y se procede a descartar casos que no cumplen con definición de caso.


Comportamiento de intoxicaciones, Santander, SE 01- 28 2025-2026



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

El departamento de Santander presenta una incidencia de intoxicaciones de 8,13 casos x 100.000 hab, los municipios con mayor incidencia son: Tona 223 casos x 100.000 hab, San Joaquín 173,84casos x 100.000 hab

Incidencia y proporción de casos de Intoxicaciones por municipio a SE 28 de 2025



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander 2026

De los grupos de sustancias, el que más registra casos notificados en el departamento de Santander es el grupo de medicamentos y otros con 112 casos (25%), seguido por plaguicidas y otros con 102 casos (23%); Los municipios que más reportan casos de intoxicaciones son Bucaramanga con 33,92%, y Giron (7,66%)




CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	43 de 112

Están reportados 55 casos, con depuración de duplicados; En el año 2025 a esta semana epidemiológica se habían notificado 76 casos .

Se concentran casos en el municipio de Floridablanca, dos conglomerados, barrio la cumbre, sector calle 200.

Casos notificados de HEPATITIS A, Santander, Semanas epidemiológicas 1- 28 2026



Casos notificados, por municipio HEPATITIS A, Santander, Semanas1-28 de 2026

Municipio	Casos	%
Floridablanca	34	61,82%
Bucaramanga	10	18,18%
Piedecuesta	4	7,27%
Giron	3	5,45%
Barrancabermeja	1	1,82%
Charta	1	1,82%
Cimitarra	1	1,82%
Suaita	1	1,82%
Santander	55	100%

Fuente, Sivigila, Secretaria de Salud de Santander, 2026



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	49 de 112

2.5.3 VIH/SIDA y muerte por SIDA

A semana epidemiológica 28 se han notificado al sistema de vigilancia SIVIGILA un total de 355 casos de VIH, evidenciándose una disminución del 24% de los casos. Por cada 1.000 nacidos vivos se presentaron 0,38 casos de VIH/sida en gestante.

Tasa de incidencia de VIH//SIDA/muerte por SIDA. Santander. SE 01-28 año 2026.

Variables		Nº casos	%
Sexo	Masculino	8	53,33%
	Femenino	7	46,67%
Área	Cabecera m/pal	14	93,33%
	Rural Disperso	1	6,67%
Condicion Final	Vivo	15	100,00%
Tipo SS	Subsidiado	11	73,33%
	Contributivo	2	13,33%
	No asegurado	2	13,33%
Total	15		

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	50 de 112

A semana epidemiológica 28 en Santander, la incidencia de casos de VIH está en 15,17 casos por cada 100.000 habitantes. El municipio de Macaravita es quien presenta mayor incidencia con un 46,32 caso por cada 100.000 habitantes.

Casos notificados de VIH/SIDA y muerte por Sida según entidad territorial de procedencia, Santander. SE 01-28 año 2026.

Municipio	Casos	VIH	SIDA	Incidencia
Macaravita	1	1	0	46,32
Chima	1	1	0	34
Barrancabermeja	55	54	1	25,44
Rionegro	7	7	0	25,21
Surata	1	1	0	24,44
Guavatá	1	1	0	23,26
Carcasí	1	1	0	22,88
Albania	1	1	0	22,47
Bucaramanga	134	128	6	21,5
Socorro	7	7	0	20,28
Puente Nacional	3	3	0	19,7
Matanza	1	1	0	19,36
Piedecuesta	36	35	1	19,17
Chipatá	1	1	0	19,14
Güepsa	1	1	0	18,36
Barichara	2	2	0	18,02
Capitanejo	1	1	0	17,79
Lebrija	7	5	2	15,44
Valle de San José	1	1	0	15,38
Giron	26	23	3	14,74
San Gil	9	9	0	14,7
San Vicente de Chucuri	5	5	0	14,51
Sucre	1	1	0	13,8
Tona	1	1	0	12,62
Barbosa	4	3	1	11,94

Cimitarra	4	4	0	11,33
Floridablanca	34	33	1	10,76
Suaita	1	1	0	9,59
Simacota	1	1	0	9,53
Sabana de Torres	3	2	1	8,46
Puerto Wilches	2	2	0	5,7
Malaga	1	1	0	4,5
El Carmen de Chucuri	1	1	0	4,47
Santander	355	339	16	15,17

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

Según el comportamiento demográfico y social el 82,82% de los casos pertenecen al sexo masculino; el 87,61% se registra en cabecera municipal. El 46,20% pertenece al régimen contributivo.

El grupo de edad entre 20 – 29 años notificaron el 36,06% de los casos. El grupo de edad entre 30 – 39 notificaron el 29,86% de los casos. El grupo de edad entre 40 – 49 notificaron el 11,27% de los casos. El grupo de edad entre 15 – 19 notificaron el 9,01% de los casos. El grupo de edad entre 50 – 59 notificaron el 8,73% de los casos. El grupo de edad entre 60 – 69 notificaron el 3,94% de los casos. El grupo de 70 años y más notificaron el 1,13% de los casos.

Comportamiento demográfico y social de los casos confirmados VIH/SIDA/muerte por SIDA. Santander. SE 01-28 año 2026.

Variables		Nº casos	%	Proporción de Incidencia
Sexo	Masculino	294	82,82%	24,84
	Femenino	61	17,18%	4,97
Área	Cabecera m/pal	311	87,61%	16,75
	Rural disperso	44	12,39%	7,94
	Centro Poblado	13	3,66%	
Condicion Final	Vivo	354	99,72%	
	Muerto	1	0,28%	

Tipo SS	Contributivo	164	46,20%	14,79
	Subsidiado	155	43,66%	13,38
	Excepcion	13	3,66%	17,84
Rango de edad	15-19	32	9,01%	17,52
	20-29	128	36,06%	33,59
	30-39	106	29,86%	28,64
	40-49	40	11,27%	12,62
	50-59	31	8,73%	11,50
	60-69	14	3,94%	6,58
	70 y mas	4	1,13%	2,17
Total	355			

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	52 de 112

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

A semana epidemiológica 28 de 2026, se ha notificado al SIVIGILA diecinueve (19) casos de lepra, de los cuales el 52,6% de los casos han sido confirmados por laboratorio. Se registra una incidencia en el departamento de 0,79 casos de lepra por cada 100.000 habitantes. El 94,7% de los casos notificados corresponden a casos nuevos y el 89,0% de los casos están clasificados como lepra multibacilar. Con respecto a la discapacidad, se tienen once (11) casos notificados con discapacidad grado II y una tasa de discapacidad grado II de 0,4 por cada 100.000 habitantes.



Casos de lepra por clasificación y grado de discapacidad, Santander, semanas epidemiológicas 01-28 2026.

Clasificación lepra	Grado de discapacidad			Total	%
	Grado 0	Grado 1	Grado 2		
Paucibacilar	2	0	0	2	11%
Multibacilar	3	3	11	17	89%
Total	5	3	11	19	100%

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

En la semana 28- 2026 no se notificaron dos casos de Hansen.


Casos de Lepra y tasa de detección por entidad territorial de residencia, Santander, semanas epidemiológicas 01-28 2026

Municipio	Casos	%	Incidencia
Contratación	5	26,32%	128,34
Bucaramanga	3	15,79%	0,48
Guadalupe	3	15,79%	62,74
Coromoro	2	10,53%	37,50
Girón	2	10,53%	1,13
Valle de San José	2	10,53%	31,04
Bolívar	1	5,26%	8,33
Carcasí	1	5,26%	22,25
Santander	19	100%	0,79

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026 – DANE

Los municipios con mayor incidencia de lepra según municipio de residencia son: Contratación, Guadalupe, Coromoro y Valle de san José. La incidencia del evento para Santander es 0,63 casos/100.000 habitantes

Incidencia de Lepra por municipio de residencia. Santander, semanas epidemiológicas 01- 28, 2026



Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026

A continuación, se presenta tabla sociodemográfica con la situación de Lepra, semana 27–2026.

Comportamiento demográfico y social de los casos Lepra, Santander, semanas epidemiológicas 01-28 2026.

Variables		N° casos	%
Sexo	Masculino	11	57,9%
	Femenino	8	42,1%
Área	Cabecera m/pal	14	73,7%
	Rural Disperso	5	26,3%
	Centro Poblado	0	0,0%
Condición Final	Vivo	19	100,0%
	Muerto	0	0,0%
	No sabe	0	0,0%
Tipo SS	Subsidiado	18	94,7%
	Contributivo	1	5,3%
	Excepción	0	0,0%
	Especial	0	0,0%
	No asegurado	0	0,0%
	Indeterminado	0	0,0%
Rango de edad	10-14	1	5,3%
	15-19	1	5,3%
	20-29	0	0,0%
	30-39	1	5,3%

40-49	3	15,8%
50-59	4	21,1%
60-69	2	10,5%
70 y mas	7	36,8%
Total	19	

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud Santander, 2026 – DANE

2.6.2 Tuberculosis

De total de casos, el 98,4% corresponden a TB Sensible, se evidencia que del total de los casos el 87,5% correspondiente a seiscientos noventa y cuatro (694) casos pertenecen a la forma pulmonar.

De acuerdo con la distribución por tipo de caso, el 89% de los casos ingresaron como confirmados por laboratorio.

Se evidencian cuarenta y cuatro (44) casos de Mortalidad de los cuales veintiuno (21) corresponden a menores de 49 años, tres (03) de ellos con coinfección VIH.

La incidencia de Tuberculosis sensible para el Departamento a semana epidemiológica 28–2026 es de 32,5 casos por 100.000 habitantes.

Según la información a semana 28 del 2026 se han notificado al SIVIGILA 792 casos de tuberculosis por todas las formas confirmadas, para una incidencia de 32,0 por 100.000 habitantes. El 3,7% de los casos de tuberculosis en todas las formas confirmadas presentan asociación a la infección con VIH.

En la Semana 28 de 2026 se notificaron veintidós (22) casos de tuberculosis de los cuales el 100% correspondió a casos tuberculosis sensible.

	Contributivo	173	22,2%
	No asegurado	16	2,1%
	Especial	7	0,9%
	Indeterminado	2	0,3%
	< 1 año	1	0,1%
	1-4	1	0,1%
	5-9	2	0,3%
	10-14	8	1,0%
	15-19	38	4,9%
Rango de edad	20-29	188	24,1%
	30-39	149	19,1%
	40-49	119	15,3%
	50-59	92	11,8%
	60-69	78	10,0%
	70 y mas	104	13,3%
	Total	780	

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026

Tuberculosis Sensible extrapulmonar por localización anatómica, Santander, semanas epidemiológicas 01-28, 2026.

LOCALIZACION	Casos	%
PLEURAL	46	53,5%
GANGLIONAR	9	10,5%
MENINGEA	7	8,1%
OTRO	7	8,1%
PERITONEAL	6	7,0%
PERICARDICA	4	4,65%
OSTEOARTICULAR	3	3,49%
RENAL	1	1,16%
INTESTINAL	1	1,16%
GENITOURINARIA	1	1,16%
CUTANEA	1	1,16%
Santander	86	100%

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

De los casos de tuberculosis sensible, se presentan 86 casos extrapulmonar, cuya localización anatómica corresponde a cuarenta y seis (46) casos pleurales.



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	58 de 112

A semana 28 de 2026 se han registrado doce (12) casos de Tuberculosis farmacorresistentes, con una incidencia de 0,50 casos por 100.000 habitantes. Los cuales fueron confirmados por laboratorio. En la semana 28 de 2026 no se notificaron casos de Tuberculosis Resistente.

Fuente: SIVIGILA. Secretaria de Salud Santander, 2026.

Los municipios con mayor incidencia de Tuberculosis farmacorresistente según municipio de residencia son: Rionegro, Bucaramanga, Barrancabermeja y Piedecuesta. La incidencia del evento para Santander es 0,33 casos/100.000 habitantes.



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	60 de 112

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	61 de 112

Tasa de notificación estimada por entidad territorial según residencia de casos de leucemia en menores de 15 años, Santander, semanas epidemiológicas 1a 28, 2026.

Entidad territorial	Casos (n)	Porcentaje (%)	Tasa por 100.000 < 15 años
ARATOCA	1	5,9%	56,37
BARICHARA	1	5,9%	40,00
BARRANCABERMEJA	1	5,9%	1,95
BUCARAMANGA	9	52,9%	7,73
CIMITARRA	1	5,9%	12,77
GIRON	1	5,9%	2,57
SAN VICENTE DE CHUCURI	2	11,8%	25,79
SOCORRO	1	5,9%	14,80
Santander	17	100,0%	3,45

Fuente: Sivigila. Tasa de notificación por 100.000 menor de 15 años, según proyecciones de población DANE 2026.

Tasa de notificación estimada por entidad territorial según residencia de casos de cáncer en menores de 18 años, Santander, semanas epidemiológicas 1 a 28, 2026

Entidad territorial	Casos (n)	Porcentaje (%)	Tasa por 100.000 < 18 años
BARBOSA	1	2,3%	11,54
BARRANCABERMEJA	4	9,1%	6,43
BUCARAMANGA	12	27,3%	8,42
CALIFORNIA	1	2,3%	144,93
EL CARMEN DE CHUCURI	2	4,5%	27,96
EL PLAYON	1	2,3%	22,55
FLORIDABLANCA	8	18,2%	10,71
GIRON	3	6,8%	6,38
LA PAZ	1	2,3%	90,50
LEBRIJA	1	2,3%	7,28
PIEDECUESTA	2	4,5%	3,98
RIONEGRO	1	2,3%	13,98
SAN GIL	2	4,5%	11,94
SAN JOSE DE MIRANDA	1	2,3%	96,71

SAN VICENTE DE CHUCURI	2	4,5%	20,94
VELEZ	1	2,3%	16,86
ZAPATOCA	1	2,3%	89,13
Santander	44	100%	7,32

Fuente: Sivigila. Tasa de notificación por 100.000 menor de 18 años, según proyecciones de población DANE 2026.

Comportamiento demográfico y social de los casos de Cáncer en Menores de 18 años, Santander, semanas epidemiológicas 1 a 28, 2026

Variable	Categoría	Casos (n)	Porcentaje (%)
Sexo	Masculino	42	65,63%
	Femenino	22	34,38%
Área	Cabecera m/pal	47	73,44%
	Centro Poblado	2	3,13%
	Rural Disperso	15	23,44%
Tipo de aseguramiento	Subsidiado	33	51,56%
	Contributivo	26	40,63%
	No asegurado	3	4,69%
	Indeterminado	0	0,00%
	Excepción	2	3,13%
	Especial	0	0,00%
Grupo de edad	Primera Infancia	2	3,13%
	Infancia	17	26,56%
	Edad escolar	17	26,56%
	Preadolescencia	12	18,75%

	Adolescencia	16	25,00%
--	--------------	----	--------

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

En el análisis de los indicadores de oportunidad estimada para **leucemias** en menores de 18 años en Santander, se evidenció que el 95,0% (19) de los casos alcanzaron la **presunción diagnóstica** en menos de dos días.

El 55,0% de los pacientes lograron la **confirmación diagnóstica** dentro de los ocho días posteriores a la presunción.

El 85,0% **inició tratamiento** en menos de cinco días tras la confirmación diagnóstica.

Estos resultados muestran avances importantes, pero también la necesidad de fortalecer la fase de confirmación para garantizar una atención integral y oportuna.

Indicadores de oportunidad de los casos de Leucemias en Menores de 18 años, Santander, semanas epidemiológicas 1 a 28, 2026

Indicadores de oportunidad	Resultado	Indicador
Oportunidad estimada en la presunción diagnóstica (OPDx) (diagnóstico)	95,0%	Alta ≤2 días
	0,0%	Media 3-10 día
	0,0%	Baja ≥ 11 días
Oportunidad estimada en la confirmación diagnóstica de leucemias (OCDx)	55,0%	Alta ≤8 días
	25,0%	Media 9-15 días
	15,0%	Baja ≥ 16 días.
Oportunidad estimada en el inicio de tratamiento de Leucemias (OITTO)	85,0%	Alta ≤ 5 días
	15,0%	Baja ≥ 6 días

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

2.7.2 Cáncer de Mama y Cuello Uterino

A la fecha se han notificado 234 casos de los cuales 149 corresponden a cáncer de mama (63,7%) y 85 a cáncer de cuello uterino (36,3%). En comparación con el año anterior, se observa un decremento 7,14%. Es importante señalar que los datos están sujetos a revisión continúa debido a notificaciones tardías, ajustes técnicos y procesos de validación de calidad. Un caso se presenta de mama en hombres para el municipio de Bucaramanga.

La tasa de incidencia de cáncer de mama y de cuello uterino en mujeres mayores de 18 años es de 24,94 casos por cada 100.000 mujeres en este grupo poblacional, considerado como la población en riesgo para dichos tipos de cáncer. Las tasas más altas se observaron en Concepción (130,32), Surata (121,51), Contratación (59,17) y Cimitarra (53,32), Bucaramanga (35,90)

La mayor proporción de casos se concentra en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón y. Esta distribución refleja una elevada carga en el área metropolitana de Bucaramanga, posiblemente asociada con factores poblacionales, procesos de urbanización y dinámicas de movilidad regional. La información detallada se presenta en la siguiente tabla.

Durante el análisis de la variación municipal entre 2025 y 2026 en la notificación de cáncer de mama y de cuello uterino en el departamento de Santander, se identificó un comportamiento heterogéneo. Se observa un incremento en la notificación de casos en 10 municipios, lo que evidencia un aumento durante el periodo analizado. Un total de 27 municipios presentan decremento, mostrando una reducción frente al mismo periodo del año anterior. El resto de los municipios permanecen estables, sin variaciones relevantes. Esta distribución territorial permite identificar áreas críticas de vigilancia y orientar de manera focalizada las acciones de control y prevención. (Ver mapa).



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	63 de 112

Casos notificados y tasas de notificación estimada de cáncer de mama y de cuello uterino por entidad territorial de residencia, Santander, semanas epidemiológicas 1 a 28, 2026

Entidad territorial	CA Mama	CA Jterino	Casos (n)	Porcentaje (%)	Tasa por 100.000 mujeres > 18 años
BARBOSA	1		1	0,4%	7,45
BARRANCABERMEJA	11	6	17	7,3%	19,28
BUCARAMANGA	54	37	91	39,1%	35,90
CIMITARRA	4	2	6	2,6%	53,32
CONCEPCION	2	1	3	1,3%	130,32
CONTRATACION	1		1	0,4%	59,17
FLORIDABLANCA	29	10	39	16,7%	30,04
GIRON	13	10	23	9,9%	34,48
LANDAZURI		1	1	0,4%	26,50
LEBRIJA	1	3	4	1,7%	21,23
LOS SANTOS		1	1	0,4%	16,57
MALAGA		2	2	0,9%	20,31
PIEDECUESTA	13	9	22	9,4%	29,49
PUENTE NACIONAL	1		1	0,4%	16,59
PUERTO WILCHES	1		1	0,4%	8,17
RIONEGRO	1	2	3	1,3%	32,14
SABANA DE TORRES	1		1	0,4%	7,60
SAN GIL	4	1	5	2,1%	17,29
SAN VICENTE DE CHUCURI	1		1	0,4%	7,94
SOCORRO	5		5	2,1%	33,93
SUAITA	1		1	0,4%	25,51
SURATA	2		2	0,9%	121,51
VELEZ	1		1	0,4%	10,29
ZAPATOCA	1		1	0,4%	24,27
Santander	148	85	233	100,0%	29,33

Fuente: Sivigila. Tasa de notificación por 100.000 mujeres mayores de 18 años, según proyecciones de población DANE 2026.

Mapa de incremento y decremento de casos de cáncer de mama y cuello uterino, Santander, semanas epidemiológicas 1a 28, 2025-2026



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

2.9.3 Lesiones por Pólvora

Para esta semana epidemiológica se tiene un acumulado en el SIVIGILA de 18 casos de Lesiones por pólvora; comparado con el año 2025 se registró una disminución del 44,94% en el número de casos respecto al año anterior. La tasa de incidencia es de 0,75 casos por cada 100.000 habitantes Los Municipios que han presentado más casos, pertenecen a las Provincias Área Metropolitana, Guanentá y Vélez. En la siguiente tabla se presentan las incidencias por municipios.

Tasa de notificación de casos por Lesiones por Pólvora, Santander, semanas epidemiológicas 1 a 28, 2026

Municipio de procedencia	Casos (n)	Porcentaje (%)	Tasa por 100.000 habitantes
BUCARAMANGA	4	22,2%	0,65
CALIFORNIA	1	5,6%	39,43
CIMITARRA	1	5,6%	2,96
CURITI	1	5,6%	6,78
GIRON	3	16,7%	1,69
JESUS MARIA	1	5,6%	29,19
LANDAZURI	1	5,6%	9,41
OIBA	1	5,6%	8,61
PIEDRECUESTA	1	5,6%	0,52
PUENTE NACIONAL	1	5,6%	6,52
SAN GIL	1	5,6%	1,41
VALLE DE SAN JOSE	1	5,6%	13,92
VELEZ	1	5,6%	3,67
SANTANDER	18	100,0%	0,75

Fuente: Sivigila Santander. Tasa de notificación por 100.000 habitantes, según proyecciones de población DANE 2026.

La siguiente tabla resume las características demográficas y sociales de los casos de lesiones por pólvora en Santander.


Comportamiento demográfico y social de los casos de lesiones por pólvora, Santander, semanas epidemiológicas 1 a 28, 2026

Variable	Categoría	Casos (n)	Porcentaje (%)
Sexo	Masculino	2	11,11%
	Femenino	16	88,89%
Área	Cabecera m/pal	12	66,67%
	Centro Poblado	0	0,00%
	Rural Disperso	6	33,33%
Tipo de aseguramiento	Contributivo	7	38,89%
	Subsidiado	8	44,44%
	No asegurado	3	16,67%
	Indeterminado	0	0,00%
	Excepción	0	0,00%
	Especial	0	0,00%
Grupo de edad	0 a 5	1	5,56%
	6 a 11	0	0,00%
	12 a 17	3	16,67%
	18 a 26	2	11,11%
	27 a 59	12	66,67%
	60 y mas	0	0,00%

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	66 de 112



Fuente: Sivigila Santander. Tasa por 100.000 habitantes, según proyecciones de población DANE 2026.

A continuación, se presentan las principales enfermedades huérfanas identificadas en el departamento

Proporción de las diez principales enfermedades huérfanas, semanas epidemiológicas 1 a 28, Santander, 2026

Nombre de la enfermedad	Casos (n)	Porcentaje (%)
Enfermedad de Von Willebrand	22	9,1%
Esclerosis sistémica cutánea limitada	18	7,5%
Esclerosis sistémica cutánea difusa	15	6,2%
Síndrome de Guillain-Barre	13	5,4%
Estenosis pulmonar valvular	13	5,4%
Déficit congénito del factor VIII	7	2,9%
Enfermedad de Kawasaki.	6	2,5%
Esclerosis Múltiple	6	2,5%
Poliartritis factor reumatoide positivo	5	2,1%
Miastenia grave	5	2,1%
Otras enfermedades huérfanas	131	54,4%
Total	241	100,0%

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

2.8 SALUD MENTAL

2.8.1 Intento de Suicidio

A semana epidemiológica 28 de 2026, se han notificado al SIVIGILA 933 intentos de suicidio; a la misma semana epidemiológica del año 2025 se notificaron 964 casos, lo que evidencia un decremento del 3,2% en el evento. Los Municipios que más aportan casos son: Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón, Piedecuesta.

La tasa de incidencia para Santander es de 38,7 casos por cada 100.000 habitantes. En la siguiente tabla se evidencian los Municipios con mayor incidencia de intento de suicidio en el Departamento de Santander.

Casos notificados vs incidencia por municipio de procedencia de Intento de Suicidio, Santander, S.E 01-28, 2026pr.			
MUNICIPIO	Casos	%	Incidencia
Oiba	13	1,4%	111,9
Malaga	20	2,1%	82,0
California	2	0,2%	78,9
Santa Barbara	2	0,2%	74,9
Betulia	5	0,5%	72,6
Paramo	4	0,4%	70,6
Galan	2	0,2%	65,3
Guadalupe	3	0,3%	64,9
San Gil	42	4,5%	59,1
Giron	102	10,9%	57,5
Bucaramanga	336	36,0%	54,3
Matanza	3	0,3%	52,4

MUNICIPIO	Casos	%	Incidencia
Socorro	18	1,9%	48,4
Capitanejo	3	0,3%	47,4
San José de Miranda	2	0,2%	45,1
Sabana de Torres	15	1,6%	39,1
Suaita	4	0,4%	38,9
Guapota	1	0,1%	37,5
Piedecuesta	72	7,7%	37,3
Charalá	5	0,5%	35,9
Mogotes	4	0,4%	35,8
Encino	1	0,1%	34,2
Aratoca	3	0,3%	33,9
Floridablanca	105	11,3%	33,3
San Benito	1	0,1%	33,0
Puerto Parra	3	0,3%	32,8
Lebrija	17	1,8%	32,6
Barrancabermeja	73	7,8%	31,7
Zapatoca	3	0,3%	29,1
Los Santos	5	0,5%	29,0
Valle de San José	2	0%	27,8
Cimitarra	9	1,0%	26,6
Cerrito	2	0,2%	26,3
Gambita	1	0,1%	24,3
Contratación	1	0,1%	23,5
Tona	2	0,2%	23,5
Rionegro	6	0,6%	22,3

MUNICIPIO	Casos	%	Incidencia
Surata	1	0,1%	21,9
Onzaga	1	0,1%	20,8
Curití	3	0,3%	20,3
Landazuri	2	0,2%	18,8
El Peñón	1	0,1%	18,8
Velez	5	0,5%	18,3
Simacota	2	0,2%	17,0
San Vicente de Chucuri	6	0,6%	16,7
Concepcion	1	0,1%	16,4
Pinchote	1	0,1%	16,2
Barichara	2	0,2%	15,2
Sucre	1	0,1%	13,6
Puente Nacional	2	0,2%	13,0
El Carmen de Chucuri	3	0,3%	12,1
Barbosa	4	0,4%	11,7
Puerto Wilches	4	0,4%	11,0
Villanueva	1	0,1%	10,9
El Playón	1	0,1%	6,5
SANTANDER	933	100%	38,7

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

En el 46,0% con 429 casos de Intento de Suicidio son desencadenados por problemas familiares, seguidos por problemas de pareja con el 26,3% con 245 casos.

Factores desencadenantes del Intento de Suicidio, Santander, semanas epidemiológicas 01- 28, 2026pr.

Desencadenante	Nº casos	%
Problemas familiares	429	46,0%
Pro. Pareja	245	26,3%
Escolar/edu	83	8,9%
Prob económico	76	8,1%
Maltrato F.P.S	61	6,5%
Enferm. Crónica	50	5,4%
Muerte de fam.	45	4,8%
Pro. Legal	37	4,0%
Suic famil Amigo	12	1,3%
Total	1038	111,3%

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

***Nota:** Los casos reportados al SIVIGILA pueden tener más de un factor desencadenante, por lo que un mismo caso puede aparecer en varias categorías. lo que explica que el total porcentual supere el 100%.

En el Departamento de Santander se describen las características sociodemográficas en la siguiente tabla.

2.9.2 Violencia de Género

A la S.E. 28 de 2026 se han notificado **3.885** casos, en la misma S.E en 2025 se habían notificado al SIVIGILA **3.619** casos de Violencia de genero e Intrafamiliar, lo que evidencia un incremento del **7,4%**. Los Municipios que más aportan casos son los del área metropolitana. La tasa de incidencia para Santander es de **161,2** casos por cada 100.000 habitantes. En la siguiente tabla se evidencian los Municipios con mayor incidencia de Violencia de género e intrafamiliar en el Departamento de Santander.

Casos notificados vs incidencia de Violencia de género e intrafamiliar por entidad territorial de procedencia, Santander, S.E 01-28, 2026pr.			
Municipio	Casos	%	Incidencia
Matanza	34	0,9%	593,7
Gambita	23	0,6%	557,8
California	11	0,3%	433,8
Landazuri	44	1,1%	413,8
Palmar	6	0,2%	387,6
Onzaga	18	0,5%	373,5
Puerto Parra	33	0,8%	360,5
Palmas Socorro	10	0,3%	355,4
Mogotes	38	1,0%	340,0
El Guacamayo	7	0,2%	315,9
Sabana de Torres	121	3,1%	315,1
El Playón	40	1,0%	261,5
Galan	8	0,2%	261,0
San Joaquin	6	0,2%	233,8
Suaita	24	0,6%	233,3

Municipio	Casos	%	Incidencia
Cepita	5	0,1%	229,1
Barrancabermeja	468	12,0%	203,0
San Gil	144	3,7%	202,6
Cimitarra	68	1,8%	201,1
Surata	9	0,2%	197,2
Contratación	8	0,2%	188,4
Guapota	5	0,1%	187,5
Piedecuesta	354	9,1%	183,5
Chima	6	0,2%	180,8
Bucaramanga	1098	28,3%	177,5
Lebrija	92	2,4%	176,5
Tona	15	0,4%	176,0
Jesús María	6	0,2%	175,1
Guadalupe	8	0,2%	173,0
Coromoro	10	0,3%	172,5
Malaga	42	1,1%	172,2
Encino	5	0,1%	170,9
Charalá	23	0,6%	165,2
Giron	286	7,4%	161,1
Aratoca	14	0,4%	158,3
Oiba	18	0,5%	154,9
Charta	5	0,1%	150,4
Enciso	6	0,15%	150,1
Curití	21	0,54%	142,4
Paramo	8	0,2%	141,2

Municipio	Casos	%	Incidencia
San Vicente de Chucuri	50	1,3%	139,2
Chipatá	7	0,2%	133,4
Valle de San José	9	0,2%	125,3
Ocamonte	8	0,2%	120,6
Villanueva	11	0,3%	119,4
Los Santos	20	0,5%	115,9
Santa Helena del Opón	4	0,10%	115,0
Hato	3	0,1%	111,7
Floridablanca	352	9,1%	111,7
Confines	4	0,1%	107,8
Zapatoca	11	0,3%	106,8
Rionegro	28	0,7%	104,1
San Andrés	9	0,2%	102,6
Guaca	7	0,2%	102,6
Barbosa	33	0,8%	96,4
Guavatá	4	0,1%	92,7
Barichara	12	0,3%	91,2
Florian	5	0,1%	87,7
Socorro	32	0,8%	86,1
Puente Nacional	13	0,3%	84,7
Sucre	6	0,2%	81,4
Pinchote	5	0,1%	81,0
Cerrito	6	0,2%	78,9
San Miguel	2	0,05%	75,0
Santa Barbara	2	0,05%	74,9

Municipio	Casos	%	Incidencia
Velez	20	0,5%	73,3
Betulia	5	0,1%	72,6
San Benito	2	0,1%	66,0
Jordán	1	0,0%	64,1
Capitanejo	4	0,10%	63,2
Carcasí	3	0,1%	60,9
la paz	3	0,1%	59,1
Puerto Wilches	21	0,5%	57,5
El Carmen de Chucuri	13	0,33%	52,3
Aguada	1	0,0%	52,3
Albania	2	0,1%	47,1
San José de Miranda	2	0,05%	45,1
Macaravita	1	0,03%	40,4
El Peñón	2	0,05%	37,6
Güepsa	2	0,05%	35,4
Bolivar	4	0,10%	34,6
Simacota	4	0,10%	34,0
Concepcion	2	0,1%	32,7
Molagavita	1	0,03%	21,0
La Belleza	1	0,03%	15,8
SANTANDER	3885	100%	161,2

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026



República de Colombia

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Gobernación de Santander

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	73 de 112

85 Municipios de Santander han reportado un caso de violencia en lo corrido del año. En el Departamento de Santander se describen las características sociodemográficas en la siguiente tabla.

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026

Nº Casos vs Incidencia de Violencia de género e intrafamiliar por rango de edad y sexo, Santander, semanas epidemiológicas 01- 28, 2026pr.

Fuente, SIVIGILA, Secretaría de Salud de Santander, 2026


A continuación, se evidencia la tasa de incidencia por tipo de violencia.



68418	SANTANDER	LOS SANTOS	2	36	55,6
68432	SANTANDER	MALAGA	3	80	37,5
68464	SANTANDER	MOGOTES	1	29	34,5
68468	SANTANDER	MOLAGAVITA	1	13	76,9
68498	SANTANDER	OCAMONTE	2	6	333,3
68547	SANTANDER	PIEDECUESTA	22	589	37,4
68572	SANTANDER	PUENTE NACIONAL	2	26	76,9
68575	SANTANDER	PUERTO WILCHES	10	120	83,3
68615	SANTANDER	RIONEGRO	10	73	137,0
68655	SANTANDER	SABANA DE TORRES	5	131	38,2
68673	SANTANDER	SAN BENITO	1	3	333,3
68679	SANTANDER	SAN GIL	9	213	42,3
68684	SANTANDER	SAN JOSE DE MIRANDA	1	7	142,9
68689	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI	6	85	70,6
68755	SANTANDER	SOCORRO	10	102	98,0
68770	SANTANDER	SUAITA	1	17	58,8
68773	SANTANDER	SUCRE	1	10	100,0
68855	SANTANDER	VALLE DE SAN JOSE	1	19	52,6
68861	SANTANDER	VELEZ	6	45	133,3
68895	SANTANDER	ZAPATOCA	3	29	103,4

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Morbilidad Materna Extrema por entidad territorial de residencia, Santander, 2026 a SE 28



Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Oportunidad notificación casos de Morbilidad Materna Extrema, Santander, 2026 a SE



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	77 de 112

nmun_notif	nom_upgd	Oportunos	Total casos notificados	% Oportunos	Interpretación
BARRANCABERMEJA	CENTRO DE SALUD CON CAMAS EL DANUBIO	1	2	50,0	Deficiente
BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO ECOPETROL	3	3	100,0	Bueno
BARRANCABERMEJA	HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO	21	31	67,7	Deficiente
BARRANCABERMEJA	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	22	26	84,6	Regular
BUCARAMANGA	ASOCIACIÓN PROFAMILIA	1	1	100,0	Bueno
BUCARAMANGA	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	71	74	95,9	Bueno
BUCARAMANGA	HOSPITAL LOCAL DEL NORTE	14	14	100,0	Bueno
BUCARAMANGA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	128	132	97,0	Bueno
CHARALA	ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARAL	0	1	0,0	Deficiente
CURITI	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI	1	1	100,0	Bueno
EL CARMEN DE CHUCURI	ESE HOSPITAL EL CARMEN	1	1	100,0	Bueno
ENCISO	ESE HOSPITAL DE ENCISO	1	1	100,0	Bueno
FLORIDABLANCA	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	9	9	100,0	Bueno
FLORIDABLANCA	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	28	28	100,0	Bueno
FLORIDABLANCA	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	33	51	64,7	Deficiente
LANDAZURI	ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI	1	1	100,0	Bueno
MALAGA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	7	7	100,0	Bueno
MOLAGAVITA	ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA	1	1	100,0	Bueno
PIEDECUESTA	HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	2	2	100,0	Bueno
PUERTO WILCHES	ESE EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE	2	2	100,0	Bueno
SABANA DE TORRES	CENTRO CLÍNICO CARVAJAL LTDA	1	1	100,0	Bueno
SABANA DE TORRES	ESE HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES	1	1	100,0	Bueno
SAN GIL	CLINICA FOSCAL SANTA CRUZ DE LA LOMA	1	1	100,0	Bueno
SAN GIL	ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL	8	8	100,0	Bueno
SOCORRO	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	13	18	72,2	Regular
VELEZ	ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ	16	16	100,0	Bueno

Durante el período de estudio se notificaron 673 casos de morbilidad materna extrema, evidenciando importantes desigualdades en su distribución. Las cabeceras municipales concentran el mayor número absoluto de casos (551; 81,9%), y la mayor razón de morbilidad (62,41). En cuanto al aseguramiento, el régimen subsidiado aporta la mayoría de los casos (382; 56,8%). Por grupos de edad, la mayor carga de morbilidad se concentra en mujeres de 20-29 años 342 (50,8%).

**Características sociodemográficas de casos de Morbilidad Materna Extrema,
Santander, 2026 a SE 28**


Variables		Nº casos	%	Razón (X 1.000 NV)
Area	Cabecera m/pal	551	81,9%	62,41
	Rural Disperso	104	15,5%	45,90
	Centro Poblado	18	2,7%	45,92
Tipo SS	Subsidiado	382	56,8%	68,74
	Contributivo	229	34,0%	43,43
	No asegurado	32	4,8%	64,26
	Excepción	27	4,0%	169,81
	Especial	3	0,3%	-
Rango de edad	15-19	96	14,3%	61,98
	20-29	342	50,8%	56,32
	30-39	212	31,5%	61,66
	40-49	23	3,4%	61,66
Total		673		

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026


Por causas agrupadas de MME, la mayor proporción corresponde a trastornos hipertensivos (67%), seguido de complicaciones hemorrágicas (20,8%) y sepsis de origen obstétrico (2,8%).



2.9.2 Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía



Notificación de Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía, Santander, 2025-2026 a SE 28



La razón más elevada de MPNT teniendo en cuenta la residencia de la madre, se ha presentado en Girón (590 caso/1 000 NV), seguido de Puerto Wilches (107,14 casos/1 000 NV). El mayor número de casos se ha presentado en Bucaramanga con 19 casos; la razón



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	79 de 112


para el municipio es de 2,2 casos/1 000 NV. La razón de MPNT para Santander es de 5,1 casos/1 000 NV.

MPNT por entidad territorial de residencia, Santander, 2026 a SE 28

Municipio	Casos	%	Nacidos Vivos	Razón
Puerto Wilches	3	3,09%	28	107,14
Floridablanca	9	9,28%	4463	2,0
Barbosa	2	2,06%	0	-
Bucaramanga	19	19,59%	8550	2,2
Barrancabermeja	19	19,59%	2936	6,5
Girón	13	13,40%	22	590,9
Piedecuesta	9	9,28%	200	45,0
San Gil	2	2,06%	1015	2,0
Betulia	2	2,06%	0	-
Sabana de Torres	2	2,06%	35	57,1
Otros municipios	17	17,53%	4238	4,0
Santander	97	100%	19052	5,1

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

MPNT por entidad territorial de residencia, Santander, 2026 a SE 28



Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	80 de 112

Características sociodemográficas de casos de mortalidad perinatal y neonatal tardía, Santander, 2026 a SE 28

Variables		Nº casos	%
Sexo	Masculino	61	62,9%
	Femenino	36	37,1%
	Indeterminado	-	-
Area	Cabecera m/pal	86	88,6%
	Rural Disperso	11	11,3%
	Centro Poblado	-	-
Tipo SS	Subsidiado	58	59,8%
	Contributivo	31	32,0%
	No asegurado	5	5,2%
	Excepción	2	2,1%
Rango de edad	10-14	-	-
	15-19	37	37,7%
	20-29	35	35,7%
	30-39	23	23,4%
	40-49	2	2,0%
Total		98	

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Momento de ocurrencia de la Mortalidad Perinatal y Neonatal Tardía respecto al parto, Santander, 2026 a SE 28



Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026


Dentro de las causas básicas de MPNT la insuficiencia renal congénita, asfixia del nacimiento-severa, fracaso de la inducción medica del trabajo de parto son las que representan mayor proporción de casos.



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	81 de 112

Notificación de casos defectos congénitos, Santander, 2025-2026 a SE 28

GRUPO DE PESO EN GRAMOS	MOMENTO DE OCURRENCIA				TOTAL MUERTES
	FETALES > 22 SEMANAS		NEONATAL		
	FETALES ANTEPARTO	FETALES INTRAPARTO	NEONATALES TEMPRANAS	NEONATALES TARDIAS	
Menor de 1000	18	19	7	5	49
De 1000 a 1499	5	7	6	2	20
De 1500 a 2499	8	2	3	1	15
De 2500 a 3999	10	1	3	1	15
4000 y más	0	0	0		0
Total general	41	29	19	9	98



Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

A semana epidemiológica 28 de 2026, se han notificado al SIVIGILA 164 casos de defectos congénitos (6 casos en la última semana). Para el año 2025 a semana epidemiológica 28 se notificaron 122 casos a SIVIGILA (3 casos en semana 26)

cada uno sugiere una alta diversidad de anomalías, lo que orienta hacia la necesidad de estudios genéticos y ecografías morfológicas detalladas.

Defectos Congénitos	Casos
CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	11
DEFECTO DEL TABIQUE VENTRICULAR	10
DEFECTO DEL TABIQUE AURICULAR	7
ATRESIA DEL ESOFAGO CON FISTULA TRAQUEOESOFAGICA	4
CADERA INESTABLE	3
OTRAS DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA	3
POLIDACTILIA, NO ESPECIFICADA	3
HERNIA DIAFRAGMATICA CONGENITA	3
GASTROSQUISIS	3
SINDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	3
MICROTIA	2
MALFORMACION CONGENITAS DE LAS CAMARAS CARDIACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA	2
ESTENOSIS CONGENITA DE LA VALVULA PULMONAR	2
SINDROME DE HIPOPLASIA DEL CORAZON DERECHO	2
CONEXIÓN ANOMALA TOTAL DE LAS VENAS PULMONARES	2
LABIO LEPORINO, BILATERAL	2
DEFORMIDAD CONGENITA DE LA CADERA, NO ESPECIFICADA	2
CRANEOSINOSTOSIS	2
MALFORMACIONES CONGENITAS MULTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	2
ENCEFALOCELE, NO ESPECIFICADO	1
MICROCEFALIA	1
ESPINA BIFIDA, NO ESPECIFICADA	1
MALFORMACION CONGENITA DEL SISTEMA NERVIOSO, NO ESPECIFICADA	1
VENTRICULO CON DOBLE ENTRADA	1

DEFECTO DEL TABIQUE AURICULOVENTRICULAR	1
ESTENOSIS CONGENITA DE LA VALVULA AORTICA	1
INSUFICIENCIA CONGENITA DE LA VALVULA AORTICA	1
INSUFICIENCIA MITRAL CONGENITA	1
COARTACION DE LA AORTA	1
OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL PULMON	1
LABIO LEPORINO, LINEA MEDIA	1
LABIO LEPORINO, UNILATERAL	1

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026

Priorización de los defectos congénitos en seguimiento, Santander, 2024 -2026 (a SE 28)

Durante el período evaluado, se observó que la mayoría de los defectos congénitos se encuentran dentro del rango esperado según las referencias epidemiológicas. En el sistema nervioso central (SNC), la hidrocefalia presentó una razón observada/esperada (O/E) de 3.00, lo que indica un ligero aumento en comparación con lo esperado, aunque aún dentro del rango normal. Por otro lado, defectos como la anencefalia (1.20) y la espina bífida (0.33) mostraron frecuencias similares o inferiores a las proyectadas. En el sistema osteomuscular, la gastroquisis y el onfalocel registraron una razón O/E de 1.00, lo que refleja una concordancia exacta con los valores esperados. Sin embargo, defectos como las deformidades congénitas de los pies y la polidactilia estuvieron por debajo de lo esperado.

En cuanto a los defectos cromosómicos, el síndrome de Edwards destacó con una razón O/E de 4.00, superando significativamente lo esperado y requiriendo mayor atención en futuros análisis. Por el contrario, el síndrome de Down (0.31) y el síndrome de Patau (0.67) se mantuvieron dentro de los parámetros normales. En el sistema circulatorio, la coartación de la aorta (0.55) y la transposición de grandes vasos (0.29) presentaron frecuencias inferiores a las esperadas, mientras que en las fisuras de labio y paladar, solo la fisura de paladar (0.86) se acercó al valor de referencia.



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	84 de 112

Priorización de los defectos congénitos en seguimiento, Santander, 2024 -2026 (a SE 28)						
DEFECTO CONGÉNITO		RAZÓN O/E	Razón esperada	Categoría (MMWR)	Poisson	Razón
SNC	Anencefalia (Q000)	1	1	Dentro del rango	0,21	1,20
	Encefalocele (Q010 – Q011 – Q012 – Q018 –Q019)	0	1	Dentro del rango	0,61	0,00
	Espina bífida (Q050 a Q059)	0	1	Dentro del rango	0,15	0,33
	Hidrocefalia (Q030 – Q031 – Q038 – Q039)	3	1	Dentro del rango	0,06	3,00
	Holoprosencefalia (Q042)	0	1	Dentro del rango	0,01	0,00
Sistema osteomuscular	Gastroquisis (Q 793)	1	1	Dentro del rango	0,37	1,00
	Onfalocele (Q792)	1	1	Dentro del rango	0,37	1,00
Defectos Extremidades	Deformidad congénita de los pies (Q660 a Q669)	0	1	Por debajo	0,00	0,22
	Polidactilia (Q690 - Q691 - Q692 - Q699)	0	1	Por debajo	0,00	0,21
	Defectos por reducción del miembro superior (Q710 a Q719)	0	1	Dentro del rango	0,21	0,40
	Defectos por reducción del miembro inferior (Q720 a Q729)	2	1	Dentro del rango	0,30	2,00
Sistema circulatorio	Coartación de la aorta (Q251)	1	1	Dentro del rango	0,11	0,55
	Tetralogía de Fallot (Q213)	0	1	Dentro del rango	0,08	0,40
	Transposición de los grandes vasos (Q201 - Q202)	0	1	Dentro del rango	0,11	0,29
Fisura de labio y paladar	Fisura de paladar (Q351 - Q353 - Q355 - Q357 - Q359)	1	1	Dentro del rango	0,22	0,86
	Labio leporino (Q360 - Q361 - Q369)	0	1	Por debajo	0,01	0,15

	Fisura del paladar con labio leporino (Q370 a Q375 -Q378 - Q379)	0	1	Por debajo	0,00	0,13
Defectos cromosómicos	Síndrome de Down (Q900 - Q901 - Q902 - Q909)	0	1	Dentro del rango	0,00	0,31
	Síndrome de Edwards (Q910 a Q913)	4	1	Por encima	0,00	4,00
	Síndrome Patau (Q914 a Q917)	1	1	Dentro del rango	0,33	0,67

Fuente: SIVIGILA. Secretaría de Salud de Santander, 2026




CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	85 de 112

2.10. Desnutrición en menores de 5 años

A semana epidemiológica 28 de 2026, se han notificado al SIVIGILA 268 casos de DNT en menores de 5 años (10 casos en la última semana). En el año 2025 se notificaron 300 casos al mismo periodo epidemiológico (8 casos en semana 28). Semanalmente el número de casos registrados se revisa debido a la notificación tardía del evento, adicionalmente las estadísticas son variables en consideración a los ajustes realizados.

Notificación de DNT en menores de 5 años, Santander, SE 01-28- 2026-2025



Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

Según residencia, la mayor prevalencia de desnutrición aguda moderada y severa por cada 100 menores de 5 años se presenta en Galan con 1,47 casos/100 menores de 5 años, Cerrito con 0,77 casos/100 menores de 5 años, Guapota con 0.68 casos/100 menores de 5 años, Bolivar con 0.61 casos/100 menores de 5 años, Guavatá con 0,61 casos/100 menores de 5 años, El Peñon con 0,52 casos/100 menores de 5 años,

Concepción con 0,52 casos /100 menores de 5 años, Guaca con 0,47 casos/100 menores de 5 años.

El municipio con mayor número de casos es Bucaramanga con 64 casos, la prevalencia para el municipio es de 0,18 casos por cada 100 menores de 5 años respectivamente. La prevalencia para Santander es de 0,17 casos por cada 100 menores de 5 años.

Casos notificados de DNT en menores de 5 años por entidad territorial de residencia, Santander, SE 01-28, 2026

MUNICIPIO	Casos	%	Prevalencia x 100 menores de 5 años
Galan	3	1,12%	1,47
Cerrito	4	1,49%	0,77
Guapota	1	0,37%	0,68
Bolivar	4	1,49%	0,61
Guavata	1	0,37%	0,61
El Penon	2	0,75%	0,52
Concepcion	2	0,75%	0,52
Guaca	2	0,75%	0,47
Curiti	4	1,49%	0,44
Bucaramanga	64	23,88%	0,18
Floridablanca	26	9,70%	0,14
Giron	22	8,21%	0,18
Piedecuesta	20	7,46%	0,16
Lebrija	7	2,61%	0,20
Rionegro	6	2,24%	0,33
Santander	268	100%	0,18

Fuente: Sivigila. Secretaria de Salud Santander, 2026

El 54,48% de los casos se presentó en el sexo masculino, el 75,37% de los casos se registró en cabecera municipal; el 73,13% de los casos se registraron en el régimen subsidiado; el 68,28% de los casos se presentó en el grupo de edad de 1 a 4 años.

Características socio demográficas de casos de DNT en menores de 5 años por Municipio, Santander, SE 01-28, 2026

Variables		Nº casos	%
Sexo	Masculino	146	54,48%
	Femenino	122	45,52%
Área	Cabecera m/pal	202	75,37%
	Rural Disperso	66	24,63%
Condicion Final	Vivo	268	100,00%
	Muerto	0	0,00%
Tipo SS	Subsidiado	196	73,13%
	Contributivo	60	22,39%
	Excepcion	7	2,61%
	No asegurado	5	1,87%
	Especial	0	0,00%
	Indeterminado	0	0,00%
Rango de edad	< 1 año	85	31,72%
	1-4	183	68,28%
Total		268	

Fuente, Sivigila, Secretaría de Salud de Santander, 2026

2.11 VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORES DE CINCO AÑOS

Santander a semana 28 del 2026 se han reportado 7 muertes probables en menores de cinco años (0) por desnutrición aguda moderada o severa, (1) Enfermedad Diarreica aguda y (6) Infección respiratoria aguda de residencia en el departamento.

Unidades de análisis desarrolladas mortalidad en menor de cinco años por IRA, EDA o DNT, Santander a S.E 01-28 de 2026

Nombre del evento	Probables	Confirmados	Analizados No concluyentes	Descartados	Total Notificados	% Analizados
DNT	0	0	0	0	0	0%
IRA	1	2	1	2	6	83%
EDA	0	1	0	0	1	100%

Fuente: Sivigila. Secretaría de Salud Santander, 2026

Lo anterior, corresponde a un caso de paciente residente en el municipio de San Andrés, Santander, la cual fue confirmado por Unidad de análisis (UA).

Un caso confirmado por IRA asociado a tos ferina, correspondiente al municipio de concepción, el cual se ajusta a municipio de residencia Cerrito. Adicionalmente, del mismo municipio se confirma mortalidad en menor de 5 años por IRA, perteneciente a la comunidad indígena UWA.

Por medio de unidad de análisis, dos (2) casos notificados por IRA, correspondientes al municipio de Bucaramanga, un caso se describe como analizado no concluyente, teniendo en cuenta que uno corresponde por línea de tiempo al país de Venezuela (caso extranjero) con mortalidad en vivienda y el otro caso, descartado, corresponde a paciente con antecedente de inmunodeficiencia congénita.

Infección Respiratoria Aguda (IRA)

La IRA mantuvo tasas elevadas durante el periodo prepandémico (3,9 → 6,8 → 6,2 entre 2017 y 2019), con un patrón cíclico característico asociado a las temporadas de baja temperatura y circulación de virus respiratorios.

En 2020 cae abruptamente a 1,8, hallazgo compatible con el efecto de las medidas no farmacológicas de la pandemia COVID-19 (uso de tapabocas, distanciamiento, cierre de jardines infantiles), que redujeron la transmisión de virus respiratorios estacionales. Sin embargo, en 2021 rebota a 6,7, posiblemente por la "deuda inmunológica" pediátrica y la circulación atípica del VSR descrita ampliamente en la literatura post-COVID.

Desde 2022 se observa una tendencia descendente sostenida (1,9 → 3,8 → 4,5 → 1,3 → 0,6), aunque con un repunte en 2024 que merece análisis de cohortes específicas.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

La EDA mostró tasas de cero o cercanas a cero entre 2017 y 2022 (excepto el pico aislado de 1,2 en 2020), lo que reflejaba un control efectivo.

A partir de 2023 se produce un cambio epidemiológico marcado: la tasa salta a 4,4 y alcanza su máximo histórico de 5,3 en 2024, superando incluso a la IRA por primera vez en la serie. Este patrón es atípico y sugiere posibles determinantes a investigar: deterioro en cobertura de vacunación contra rotavirus, problemas de acceso a agua segura y saneamiento, eventos climáticos extremos (fenómeno de El Niño 2023-2024), o desplazamientos poblacionales.

La caída a 0,0 en 2025 y 0,6 en 2026 podría indicar que el evento fue contenido, pero amerita vigilancia estricta.

Desnutrición (DNT)

La DNT mostró el comportamiento más estable de la serie, con una tasa basal de 0,6 entre 2017 y 2022. En 2023 se registra un pico anómalo de 2,5, coincidente con el inicio del repunte de EDA, lo que sugiere una posible interacción sindémica: la diarrea persistente es causa directa de desnutrición aguda, y la desnutrición aumenta la letalidad por diarrea.


Este es un hallazgo epidemiológicamente relevante. Tras el pico, la tasa retorna a niveles bajos (0,6 en 2024; 0,0 en 2025 y 2026).



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	90 de 112

y un descenso hasta 0,61–0,65 en mayo y junio. En conjunto, los resultados evidencian un predominio de ITS-AC durante los primeros meses del año, mientras que en junio se observa un cambio en el patrón epidemiológico debido al incremento de la incidencia de NAV, lo que hace necesario fortalecer las estrategias de prevención y control asociadas al manejo de la ventilación mecánica.

Tasa de incidencia (X 1000 días dispositivo) por mes y tipo de las Infecciones Asociadas a Dispositivos, Santander.



Fuente: SIVIGILA WEB

Desde un enfoque epidemiológico, a la semana epidemiológica 28 de 2026 se notificaron 126 infecciones asociadas a dispositivos (IAD), con predominio del sexo masculino (60%) sobre el femenino (40%). La mayor proporción de casos correspondió a pacientes afiliados al régimen subsidiado (52%), seguido del contributivo (41%), mientras que los regímenes de excepción (6%) y especial (1%) representaron una baja frecuencia y no se registraron casos en población no asegurada. La mayor carga de enfermedad se concentró en la UCI de adultos, donde la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC) fue el evento más frecuente (29 casos; 43% de las IAD en este servicio), seguida de la infección del tracto

urinaria asociada a catéter (ISTU-AC) (21 casos; 31%) y la neumonía asociada a ventilación (NAV) (17 casos; 25,4%). En la UCI pediátrica también predominó la ITS-AC (22 casos; 75,9%), mientras que en la UCI neonatal el evento más frecuente fue la ITS-AC (19 casos; 63%), seguida de la NAV (11 casos; 36,7%). Respecto al desenlace, el 86% de los pacientes egresaron vivos y el 14% fallecieron, lo que evidencia una elevada supervivencia, aunque persiste una carga importante de mortalidad asociada a estos eventos, especialmente en las unidades de cuidado intensivo, donde deben fortalecerse las estrategias de prevención, vigilancia y control de las IAD.

Comportamiento Social y Demográfico de los casos de IAD en UCI Santander, semanas epidemiológicas 1-28, año 2026

Variable	Categoría	UCI-Adulto						UCI-Pediatrico						UCI-Neonatal				Total	%
		NAV	%	ISTU-A-C	%	ITS-AC	%	NAV	%	ISTU-A-C	%	ITS-AC	%	NAV	%	ITS-A-C	%		
Sexo	Femenino	7	6%	8	6.3%	9	7%	3	2.4%	2	1.6%	11	9%	2	1.6%	8	6%	50	40%
	Masculino	10	8%	13	10.3%	20	16%	2	1.6%	0	0.0%	11	9%	9	7.1%	11	9%	76	60%
Régimen de Seguridad Social	Contributivo	5	4%	10	7.9%	16	13%	2	1.6%	1	0.8%	5	4%	9	7.1%	4	3%	52	41%
	No Asegurado	0	0%	0	0.0%	0	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	0	0.0%	0	0%	0	0%
	Especial	0	0%	0	0.0%	1	1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0%	0	0.0%	0	0%	1	1%
	Excepción	1	1%	0	0.0%	5	4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1%	0	0.0%	1	1%	8	6%
	Subsidiado	11	9%	11	8.7%	7	6%	3	2.4%	1	0.8%	16	13%	2	1.6%	14	11%	65	52%
Condición Final	Vivo	14	11%	20	15.9%	23	18%	5	4.0%	2	1.6%	20	16%	9	7.1%	15	12%	108	86%
	Muerto	3	2%	1	0.8%	6	5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2%	2	1.6%	4	3%	18	14%


Fuente: SIVIGILA WEB

Durante las semanas epidemiológicas 1 a 28 de 2026, las infecciones asociadas a dispositivos (IAD) se concentraron principalmente en los extremos de la vida. La primera infancia (0 a 5 años) presentó la mayor proporción de casos, con 26% en hombres y 20% en mujeres, seguida por las personas mayores de 60 años, con 17% y 8%, respectivamente. En el grupo de adultez (27 a 59 años) se registró el 12% de los casos en hombres y el 7% en mujeres, mientras que la participación de los grupos de juventud (19 a 26 años), adolescencia (12 a 18 años) e infancia (6 a 11 años) fue menor. En general, se observa un predominio del sexo masculino en la mayoría de los grupos etarios, especialmente en la primera infancia y en las personas mayores, lo que evidencia una mayor carga de IAD en estos grupos poblacionales y resalta la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y control dirigidas tanto a pacientes pediátricos como a adultos mayores con uso de dispositivos invasivos.



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	91 de 112

Porcentaje de casos de IAD según sexo y grupo de edad. Santander semanas epidemiológicas 1-28, año 2026



Fuente: SIVIGILA WEB

Durante las semanas epidemiológicas 1 a 28 de 2026 en Santander se notificaron 126 infecciones asociadas a dispositivos (IAD) en unidades de cuidado intensivo. Debido a la presencia de infecciones polimicrobianas y a los episodios de neumonía asociada a ventilación (NAV) confirmados por criterios clínicos, se identificaron 143 agentes causales. El microorganismo predominante fue *Klebsiella pneumoniae*, con 27 aislamientos (21%), principalmente en la UCI de adultos (19 aislamientos), asociado con mayor frecuencia a ISTU-AC e ITS-AC, además de presentarse en las UCI pediátrica y neonatal. En segundo lugar se ubicó *Staphylococcus epidermidis*, con 14 aislamientos (11%), predominando en las ITS-AC de las UCI pediátrica y neonatal. Le siguió *Pseudomonas aeruginosa*, con 12 aislamientos (10%), distribuida principalmente en la UCI de adultos y, en menor proporción, en las UCI pediátrica y neonatal. También destacaron *Staphylococcus aureus* con 9 aislamientos (7%), *Escherichia coli* y *Serratia marcescens*, con 7 aislamientos cada uno (6%), mientras que

Enterococcus faecalis y *Staphylococcus haemolyticus* registraron 5 aislamientos (4%) cada uno. Asimismo, se identificó *Candida auris* en 3 aislamientos (2%), microorganismo de especial importancia epidemiológica por su potencial de transmisión intrahospitalaria y su resistencia a múltiples antifúngicos. Adicionalmente, se notificaron 30 episodios de NAV confirmados por criterios clínicos, que representaron el 24% del total de agentes reportados. En conjunto, los hallazgos evidencian un predominio de bacilos Gram negativos, especialmente en la UCI de adultos, donde se concentra la mayor carga de infecciones asociadas a dispositivos durante el periodo analizado.

Agentes causales asociados a IAD en unidades de cuidado intensivo, Santander, semanas epidemiológicas 1-28, año 2026

Migroorganismo	UCI ADULTO			TOTAL UCI	UCI PEDIATRICA			TOTAL UCI PEDIATRICA	UCI NEONATAL		TOTAL UCI NEONATAL	Total general	%
	NAV	ISTU-AC	ITS-AC		NAV	ISTU-AC	ITS-AC		NAV	ITS-AC			
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	3	9	7	19	0	1	2	3	1	4	5	27	21%
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	0	0	3	3	0	0	6	6	0	5	5	14	11%
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	5	3	8	1	0	1	2	1	1	2	12	10%
<i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	2	2	0	0	6	6	0	1	1	9	7%
<i>Escherichia coli</i>	0	2	3	5	0	1	1	2	0	0	0	7	6%
<i>Serratia marcescens</i>	0	2	0	2	1	0	2	3	0	2	2	7	6%
<i>Enterococcus faecalis</i>	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3	5	4%
<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	4	5	4%
<i>Candida auris</i>	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	3	2%
<i>Candida tropicalis</i>	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2%
<i>Proteus mirabilis</i>	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	2%
<i>Candida albicans</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2%
<i>Klebsiella aerogenes</i>	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2%
<i>Staphylococcus hominis</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	2%
<i>Candida glabrata</i>	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1%
<i>Candida parapsilosis</i>	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1%
<i>Enterobacter cloacae complex</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1%
<i>Enterobacter hormaechei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1%
<i>Enterobacteriaceae</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1%
<i>Enterococcus faecium</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1%
<i>Klebsiella oxytoca</i>	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1%
<i>Morganella morganii</i>	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1%
<i>Providencia rettgeri</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1%
<i>Staphylococcus</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1%
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1%
<i>Streptococcus gallolyticus</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1%
NAV confirmado por clínica	14	1	2	17	3	0	1	4	9	0	9	30	24%
Total general	18	24	34	76	5	3	25	33	11	23	34	143	

Fuente: SIVIGILA WEB



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	92 de 112

Durante el periodo enero a junio de 2026, el indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de Infecciones Asociadas a Dispositivos (IAD) en UCI adulto evidenció un desempeño satisfactorio en la mayoría de las UPGD del departamento. Se observa que la mayor parte de las instituciones mantuvieron un cumplimiento del 100% durante los seis meses evaluados, reflejando oportunidad y continuidad en el reporte de la vigilancia colectiva. No obstante, se identifican incumplimientos puntuales en el mes de junio en tres UPGD, así como una institución que presentó incumplimiento en mayo y junio, afectando el cumplimiento global del periodo. Aunque estos casos representan una proporción reducida frente al total de instituciones evaluadas, es necesario fortalecer el seguimiento y la asistencia técnica a las UPGD con reportes pendientes, con el fin de garantizar la oportunidad, completitud y calidad de la información generada para la vigilancia epidemiológica de las IAD en el departamento.

Indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de IAD en UCI adulto por UPGD, enero a junio año 2026

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	%
BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO ECOPETROL	1	1	1	1	1	1	100
	UCI SALUD VITAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	1	100
	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	1	1	1	1	1	1	100
BUCARAMANGA	CLINICA CHICAMOCHA SA	1	1	1	1	1	1	100
	CLINICA GESTIONAR BIENESTAR	1	1	1	1	1	1	100
	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	1	1	1	1	1	1	100
	CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	1	1	1	1	1	1	100
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1	1	1	1	1	1	100
	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANG	1	1	1	1	1	1	100
	SEDE GONZALEZ VALENCIA	1	1	1	1	1	1	100
FLORIDABLANCA	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	1	100
	FUNDACION FOSUNAB	1	1	1	1	1	0	83
	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	1	1	1	1	1	1	100
	VIVASALUD IPS	1	1	1	1	1	1	100
PIEDRECUESTA	CLINICA PIEDECUESTA SA	1	1	1	1	0	0	67
	HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	0	83
SOCORRO	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	1	1	1	1	1	1	100

Fuente: SIVIGILA WEB

de adherencia por parte de las UPGD del departamento. Se evidencia que cinco de las seis instituciones mantuvieron un cumplimiento del 100% durante todos los meses evaluados, garantizando la oportunidad y continuidad en el reporte de la vigilancia colectiva. Únicamente una UPGD presentó incumplimiento en el mes de junio, lo que representa un evento puntual dentro del periodo analizado. En general, los resultados reflejan un desempeño satisfactorio del sistema de vigilancia en las UCI pediátricas; no obstante, es importante realizar seguimiento a la institución con reporte pendiente para asegurar el cumplimiento total y mantener la calidad y oportunidad de la información epidemiológica.

Indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de IAD en UCI Pediátrica por UPGD, enero a junio año 2026

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	%
BARRANCABERMEJA	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	1	1	1	1	1	1	100
BUCARAMANGA	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	1	1	1	1	1	1	100
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1	1	1	1	1	1	100
FLORIDABLANCA	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	1	100
	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	1	1	1	1	1	1	100
PIEDECUUESTA	HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	0	83

Fuente: SIVIGILA WEB

Durante el periodo de enero a junio de 2026, el cumplimiento de la notificación colectiva de IAD en las UCI neonatales fue del 100%, evidenciando que las seis UPGD con este servicio realizaron de manera oportuna y completa el reporte mensual de la información. Este resultado demuestra un adecuado compromiso institucional con la vigilancia epidemiológica y fortalece el cumplimiento del indicador nacional evaluado por el Instituto Nacional de Salud (INS), permitiendo disponer de información confiable para el monitoreo y análisis de las infecciones asociadas a dispositivos en esta población altamente vulnerable.

Durante el periodo enero a junio de 2026, el indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de Infecciones Asociadas a Dispositivos (IAD) en UCI pediátrica mostró un alto nivel



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	93 de 112

Indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de IAD en UCI Neonatal por UPGD, enero a junio año 2026

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	%
BARRANCABERMEJA	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	5	5	5	5	5	5	100
BUCARAMANGA	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	5	5	5	5	5	5	100
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	5	5	5	5	5	5	100
FLORIDABLANCA	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	5	5	5	5	5	5	100
	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	5	5	5	5	5	5	100
SOCORRO	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	5	5	5	5	5	5	100


Fuente: SIVIGILA WEB

2.12.2 INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS (IAPMQ)

Hasta la semana epidemiológica 28 de 2026, se han notificado al SIVIGILA 69 casos de Infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos a diferencia del año 2025 donde se presentaron 67 casos, lo cual representa un incremento de 3%.

Durante el periodo de enero a junio de 2026 se notificaron 69 casos de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos (IAPMQ) en Santander. La cesárea concentró la mayor proporción de casos, con 37 notificaciones (54%), evidenciando un comportamiento persistente durante todo el semestre, con los mayores registros en enero y marzo (9 casos cada uno). En segundo lugar se ubicó la herniorrafia, con 13 casos (19%), presentando un incremento entre marzo y abril. El parto vaginal aportó 10 casos (14%), con mayor frecuencia en febrero, mientras que la colecistectomía registró 7 casos (10%), principalmente en marzo. La revascularización miocárdica (RVM) fue el procedimiento con menor participación, con 2 casos (3%). En términos temporales, marzo concentró el mayor número de notificaciones del semestre, seguido de enero, lo que sugiere un comportamiento fluctuante de las IAPMQ, con predominio de los procedimientos obstétricos, especialmente la cesárea, como principal contribuyente a la carga de estos eventos en el departamento.

Porcentaje de IAPMQ notificados en Santander, según procedimiento y mes año 2026



Fuente: SIVIGILA WEB

Durante las semanas epidemiológicas 1 a 28 de 2026, los casos de infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos (IAPMQ) en Santander se concentraron principalmente en mujeres (90%), comportamiento explicado por el predominio de infecciones posteriores a cesáreas, procedimiento que aportó la mayor carga de casos. Según el régimen de aseguramiento, la mayor proporción correspondió al régimen contributivo (51%), seguido del subsidiado (39%), mientras que los casos en población no asegurada y de excepción fueron poco frecuentes. En cuanto a la edad, se observó una mayor afectación en la población adulta joven de 30 a 34 años (20%), seguida de los grupos de 15 a 19 años y mayores de 60 años (17% cada uno) y de 25 a 29 años (14%), lo que refleja una importante participación de la población en edad reproductiva, asociada principalmente a las infecciones posteriores a cesárea y parto vaginal, así como de adultos mayores relacionados con procedimientos quirúrgicos diferentes. Este comportamiento evidencia que las IAPMQ presentan una distribución influenciada por el tipo de procedimiento realizado y por las características demográficas de la población atendida en el departamento.



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	94 de 112

Comportamiento Social y Demográfico de los casos de IAPMQ en Santander, semanas epidemiológicas 1-28, año 2026

Variable	Categoría	Cesárea	%	Herniorrafia	%	Parto vaginal	%	Revascularización miocárdica con incisión torácica y del sitio donante	%	Colecistectomía	%	Total	%
Sexo	Femenino	37	54%	8	11,6%	10	14%	1	1,4%	6	8,7%	62	90%
	Masculino	0	0%	5	7,2%	0	0%	1	1,4%	1	1,4%	7	10%
Régimen de Seguridad Social	Contributivo	21	30%	8	11,6%	2	3%	1	1,4%	3	4,3%	35	51%
	Indeterminado	1	1%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1%
	No Asegurado	1	1%	0	0,0%	1	1%	0	0,0%	0	0,0%	2	3%
	Excepción	1	1%	0	0,0%	0	0%	1	1,4%	2	2,9%	4	6%
	Subsidiado	13	19%	5	7,2%	7	10%	0	0,0%	2	2,9%	27	39%
Grupos de edad	0-4	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	5-9	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	10-14	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	15-19	9	13%	0	0,0%	3	4%	0	0,0%	0	0,0%	12	17%
	20-24	10	14%	0	0,0%	4	6%	0	0,0%	0	0,0%	14	20%
	25-29	7	10%	1	1,4%	2	3%	0	0,0%	0	0,0%	10	14%
	30-34	5	7%	0	0,0%	1	1%	0	0,0%	0	0,0%	6	9%
	35-39	6	9%	1	1,4%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	7	10%
	40-44	0	0%	3	4,3%	0	0%	0	0,0%	1	1,4%	4	6%
	45-49	0	0%	0	0,0%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
	50-54	0	0%	1	1,4%	0	0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1%
	55-60	0	0%	0	0,0%	0	0%	1	1,4%	2	2,9%	3	4%
	>60	0	0%	7	10,1%	0	0%	1	1,4%	4	5,8%	12	17%

Fuente: SIVIGILA WEB

La incidencia de las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos (IAPMQ), expresada por 100 procedimientos realizados, evidenció un comportamiento variable entre enero y junio de 2026 según el tipo de intervención. La cesárea presentó la mayor carga de infección durante todo el periodo, con incidencias entre 0,33 y 0,94 por 100 procedimientos, alcanzando sus valores más altos en enero (0,94) y marzo (0,92). La histerorrafia mostró un incremento progresivo hasta marzo (0,71), seguido de una disminución en los meses posteriores. En el parto vaginal, la incidencia fue más elevada en febrero (1,01), sin casos registrados en marzo y junio. Por su parte, la revascularización miocárdica con incisión torácica y del sitio donante presentó las incidencias más altas entre los procedimientos

evaluados, con 1,56 en marzo y 1,69 por 100 procedimientos en mayo, aunque con un bajo número de intervenciones, lo que puede generar una mayor variabilidad del indicador. Finalmente, la colecistectomía registró incidencias moderadas, con un máximo de 0,60 en marzo. En conjunto, marzo concentró los mayores valores de incidencia para la mayoría de los procedimientos, mientras que en junio se observó una reducción general de las tasas, lo que sugiere un comportamiento más favorable hacia el cierre del primer semestre de 2026.

Incidencia de las Infecciones Asociadas a Procedimientos Médico Quirúrgicos por procedimiento en Santander, enero a junio año 2026

Procedimientos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Cesárea	0,94	0,47	0,92	0,78	0,42	0,33
Herniorrafia	0,00	0,29	0,71	0,48	0,27	0,17
Parto vaginal	0,32	1,01	0,00	0,18	0,39	0,00
Revascularización miocárdica con incisión torácica y del sitio donante	0,00	0,00	1,56	0,00	1,69	0,00
Colecistectomía	0,00	0,37	0,60	0,00	0,39	0,00

Fuente: SIVIGILA WEB

Durante las semanas epidemiológicas 1 a 28 de 2026 se identificaron 73 agentes etiológicos asociados a las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos (IAPMQ) en Santander. De estos, 55 (80%) correspondieron a casos confirmados por criterios clínicos, mientras que 18 (20%) contaron con aislamiento microbiológico. Entre los microorganismos identificados, *Staphylococcus aureus* fue el agente más frecuente, con 7 aislamientos (10%), seguido de *Klebsiella pneumoniae* con 3 casos (4%) y *Enterococcus faecalis* con 2 casos (3%). Otros microorganismos, como *Citrobacter amalonaticus*, *Corynebacterium*, *Enterobacter cloacae*, *Enterococcus raffinosus*, *Morganella morganii* y *Serratia marcescens* registraron un caso cada uno (1%). La mayor proporción de aislamientos microbiológicos se presentó en infecciones posteriores a cesárea, mientras que en los demás procedimientos predominó el diagnóstico por criterios clínicos. Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer la toma de muestras microbiológicas y la confirmación etiológica para orientar de manera más precisa las estrategias de vigilancia, prevención y tratamiento de las IAPMQ en el departamento.



CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	95 de 112

Microorganismos	Cesárea	Herniorrafia	Parto vaginal	Revascularización miocárdica con incisión torácica y del sitio donante	Colecistectomía	Total general	%
<i>Staphylococcus aureus</i>	7	0	0	0	0	7	12%
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1	0	0	1	1	3	5%
<i>Enterococcus faecalis</i>	2	0	0	0	0	2	3%
<i>Citrobacter amalonaticus</i>	0	0	0	0	1	1	2%
<i>Corynebacterium</i>	1	0	0	0	0	1	2%
<i>Enterobacter cloacae</i>	1	0	0	0	0	1	2%
<i>Enterococcus raffinosus</i>	0	0	0	0	1	1	2%
<i>Morganella morganii</i>	1	0	0	0	0	1	2%
<i>Serratia marcescens</i>	1	0	0	0	0	1	2%
Casos confirmados por clínica	20	9	10	0	5	44	76%

Durante el periodo de enero a junio de 2026, el indicador de cumplimiento de la notificación colectiva de IAPMQ evidenció un desempeño satisfactorio en la mayoría de las UPGD del departamento. De las instituciones que realizan vigilancia de este evento, 28 alcanzaron un cumplimiento del 100%, garantizando la notificación oportuna durante los seis meses evaluados. Un segundo grupo presentó un 83% de cumplimiento, debido principalmente a la ausencia de reporte en un mes del semestre, entre ellas la ESE Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa, Clínica Reina Lucía, Clínica Revivir, ESE Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento de Charalá, ESE Hospital San Rafael de Concepción, Fundación FOSUNAB, Hospital Internacional de Colombia, Instituto Cardiovascular Sede Ambulatoria, ESE Hospital Regional San Gil y ESE Hospital Regional Manuela Beltrán. La Clínica Piedecuesta registró un cumplimiento del 67%, con incumplimiento en mayo y junio. Por otra parte, las ESE Hospital Integrado San Antonio de Puente Nacional, Hospital Regional de Vélez y Hospital de Zapatoca presentaron 0% de cumplimiento, situación que requiere verificación para establecer si corresponde a ausencia de procedimientos objeto de vigilancia o a incumplimiento en la notificación. En general, los resultados reflejan una alta adherencia al

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	%
BARBOSA	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO	1	0	1	1	1	1	83%
BARRANCABERMEJA	CLINICA REINA LUCIA SAS	1	1	1	1	1	0	83%
	DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO ECOPETROL	1	1	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO	1	1	1	1	1	1	100%
	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	1	1	1	1	1	1	100%
	UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA	1	1	1	1	1	1	100%
BUCARAMANGA	BATALLÓN DE ASPC NO5 HOSPITAL MILITAR BUCARAM	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA CHICAMOCHA SA	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA ESPCO-DESAN	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA GESTIONAR BIENESTAR	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA REVIVIR SA	1	1	0	1	1	1	83%
	CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	1	1	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL LOCAL DEL NORTE	1	1	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1	1	1	1	1	1	100%
IPS CABECERA SAS	1	1	1	1	1	1	100%	

	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANG	1	1	1	1	1	1	100%
	SEDE GONZALEZ VALENCIA	1	1	1	1	1	1	100%
	UIMIST	1	1	1	1	1	1	100%
CHARALA	ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARAL	1	1	1	1	1	0	83%
CONCEPCION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL	1	1	1	1	1	0	83%
FLORIDABLANCA	ESE CLINICA GUANE Y SU RED INTERAL DE SALUD	1	1	1	1	1	1	100%
	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	1	1	1	1	1	1	100%
	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	1	100%
	FUNDACION FOSUNAB	1	1	1	1	1	0	83%
	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	1	1	1	1	1	1	100%
LEBRIJA	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE LEBR	1	1	1	1	1	1	100%
MALAGA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	1	1	1	1	1	1	100%
MOGOTES	ESE HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER DE MOGOTES SANTANDER	1	1	1	1	1	1	100%
PIEDRECUESTA	CLINICA PIEDECUESTA SA	1	1	1	1	0	0	67%
	HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	0	83%
	INSTITUTO CARDIOVASCULAR SEDE AMBULATORIA	1	1	1	1	1	0	83%
PUENTE NACIONAL	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0%

SAN GIL	CLINICA FOSCAL SANTA CRUZ DE LA LOMA	1	1	1	1	1	1	100%
	ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL	1	1	1	1	1	0	83%
SOCORRO	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	1	1	1	1	0	1	83%
VELEZ	ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ	0	0	0	0	0	0	0%
ZAPATOCA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA	0	0	0	0	0	0	0%

Fuente: SIVIGILA WEB

2.12.3 CONSUMO DE ANTIBIOTICOS (CAB)

Durante el periodo de enero a junio de 2026, el consumo de antibióticos en las unidades de cuidado intensivo (UCI) de Santander, medido en Dosis Diarias Definidas (DDD) por 100 camas-día, estuvo liderado por piperacilina, con un promedio semestral de 14,94 DDD/100 camas-día, seguida de meropenem (13,11 DDD/100 camas-día), evidenciando un alto uso de antibióticos de amplio espectro en pacientes críticos. En un segundo grupo se ubicaron ceftriaxona (5,25), vancomicina (5,20) y gentamicina (4,37 DDD/100 camas-día); sin embargo, este último antibiótico presentó un valor atípico en marzo (23,13 DDD/100 camas-día), muy superior al registrado en el resto de los meses, lo que sugiere la necesidad de verificar la calidad del dato o evaluar un cambio puntual en el patrón de prescripción. Por su parte, oxacilina (3,23), cefepime (2,74) y linezolid (2,25) mostraron consumos intermedios, mientras que ceftazidima (0,86) y ertapenem (0,32) registraron un uso bajo. Finalmente, doripenem no presentó consumo durante el semestre. En general, el perfil de utilización refleja el predominio de antibióticos de amplio espectro, por lo que se recomienda mantener el seguimiento de estos indicadores en el marco de los programas de optimización del uso de antimicrobianos (PROA), especialmente frente a consumos inusuales que ameriten validación.



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	98 de 112

situaciones aisladas, el comportamiento general demuestra una alta adherencia al proceso de notificación, lo que favorece el monitoreo continuo del consumo de antimicrobianos y el seguimiento de los indicadores del Programa de Optimización del Uso de Antimicrobianos (PROA). Se recomienda fortalecer el seguimiento a las UPGD con reportes incompletos para garantizar el cumplimiento oportuno y la calidad de la información durante todo el año.

Porcentaje de cumplimiento de notificación del consumo de antibióticos en UCI, Santander, enero a junio año 2026

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	%
BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO ECOPETROL	1	1	1	1	1	1	100
	UCI SALUD VITAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	1	100
	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	1	1	1	1	1	0	83
BUCARAMANGA	CLINICA CHICAMOCHA SA	1	1	1	1	1	1	100
	CLINICA GESTIONAR BIENESTAR	1	1	1	1	1	1	100
	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	1	1	1	1	1	1	100
	CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	1	1	1	1	1	1	100
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1	1	1	1	1	1	100
	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANG	1	1	1	1	1	1	100
	SEDE GONZALEZ VALENCIA	1	1	1	1	1	1	100
FLORIDABLANCA	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	1	100
	FUNDACION FOSUNAB	1	1	1	1	1	1	100
	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	1	1	1	1	1	1	100
	VIVASALUD IPS	1	1	1	1	1	1	100
PIEDRECUESTA	CLINICA PIEDECUESTA SA	1	1	1	1	0	0	67
	HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	0	83
SOCORRO	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	1	1	1	1	1	1	100

Fuente: SIVIGILA WEB

Durante el periodo de enero a junio de 2026, el cumplimiento de la notificación del consumo de antibióticos en los servicios de hospitalización no UCI fue alto en la mayoría de las UPGD del departamento. Treinta y tres instituciones (66%) alcanzaron un 100% de cumplimiento, reflejando una adecuada oportunidad y continuidad en el reporte mensual. Un segundo grupo de instituciones presentó un 83% de cumplimiento, debido principalmente a la omisión del reporte en un solo mes del semestre, entre ellas la ESE Hospital Integrado San Bernardo, la Clínica Reina Lucía, la Unidad Clínica La Magdalena, la ESE Hospital Luis Carlos Galán

Samimiento de Charalá, la ESE Hospital San Rafael de Concepción, la ESE Hospital Santa Ana de Guaca, el Hospital Internacional de Colombia y la ESE Hospital Integrado San Antonio, entre otras. La Clínica Piedecuesta S.A. registró un cumplimiento del 67%, al no reportar durante mayo y junio. Por otra parte, la ESE Blanca Alicia Hernández, la ESE Hospital Regional de Vélez y la ESE Hospital de Zapatoca presentaron 0% de cumplimiento, situación que requiere verificar si corresponde a ausencia de servicios objeto de vigilancia o a incumplimiento en la notificación. En general, los resultados evidencian un adecuado desempeño del departamento en el reporte del consumo de antibióticos en hospitalización no UCI, aunque persisten oportunidades de mejora para lograr el cumplimiento total en todas las instituciones.

Porcentaje de cumplimiento de notificación del consumo de antibióticos en Hospitalización No UCI, Santander, enero a junio año 2026

nmun_notif	nom_upgd	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	%
ALBANIA	ESE BLANCA ALICIA HERNANDEZ	0	0	0	0	0	0	0%
BARBOSA	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO	1	1	0	1	1	1	83%
BARRANCABERMEJA	CENTRO DE SALUD CON CAMAS CASTILLO	1	1	1	1	0	1	83%
	CENTRO DE SALUD CON CAMAS ELCENTRO	1	1	1	1	0	1	83%
	CENTTRO DE SALUD CON CAMAS EL DANUBIO	1	1	1	1	0	1	83%
	CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA REINA LUCIA SAS	1	1	1	1	1	0	83%
	DEPARTAMENTO DE SALUD MAGDALENA MEDIO ECOPETROL	1	1	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO	1	1	1	1	1	1	100%
	UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA SAS	1	1	1	1	1	0	83%
	UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS LIMITADA	1	1	1	1	1	1	100%
	BUCARAMANGA	BATALLÓN DE ASPC NO5 HOSPITAL MILITAR BUCARAM	1	1	1	1	1	1



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	99 de 112

	CENTRO MEDICO QUIRURGICO LA RIVIERA SAS	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA CHICAMOCHA SA	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA CHICAMOCHA SEDE CONUCOS	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA ESPCO-DESAN	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA GESTIONAR BIENESTAR	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA	1	1	1	1	1	1	100%
	CLINICA URGENCIAS BUCARAMANGA SAS	1	1	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL LOCAL DEL NORTE	1	1	1	1	1	1	100%
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1	1	1	1	1	1	100%
	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANG	1	1	1	1	1	1	100%
	MESSER COLOMBIA SA AGENCIA REMEO CENTER BUCARAMANG	1	1	1	1	1	1	100%
	SEDE GONZALEZ VALENCIA	1	1	1	1	1	1	100%
	UIMIST	1	1	1	1	1	1	100%
	CERRITO	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO	0	0	0	0	0	0
CHARALA	ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARAL	1	1	1	1	1	0	83%
CONCEPCION	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL	1	1	1	1	1	0	83%
FLORIDABLANCA	ESE CLÍNICA GUANE Y SU RED INTERAL DE SALUD	1	1	1	1	1	1	100%
	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA	1	1	1	1	1	1	100%
	FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	1	100%

	FUNDACION FOSUNAB	1	1	1	1	1	1	100%
	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SDER FOSCAL	1	1	1	1	1	1	100%
GIRON	CLINICA GIRON ESE	1	1	1	1	1	1	100%
GUACA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ANA	1	1	1	1	1	0	83%
LA BELLEZA	ESE HOSPITAL SAN MARTIN LA BELLEZA	1	1	1	1	1	1	100%
LEBRIJA	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE LEBR	1	1	1	1	1	1	100%
MALAGA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA	1	1	1	1	1	1	100%
MOGOTES	ESE HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER DE MOGOTES SANTANDER	1	1	1	1	1	1	100%
OIBA	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	0	1	1	1	1	1	83%
PIEDRECUESTA	CLINICA PIEDRECUESTA SA	1	1	1	1	0	0	67%
	HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1	1	1	1	1	0	83%
PUENTE NACIONAL	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO	1	1	1	1	1	0	83%
SAN GIL	CLINICA FOSCAL SANTA CRUZ DE LA LOMA	1	1	1	1	1	1	100%
	ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL	1	1	1	1	1	1	100%
SOCORRO	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	1	1	1	1	1	1	100%
SUCRE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SUCRE	1	1	1	1	1	1	100%
VELEZ	ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ	0	0	0	0	0	0	0%
ZAPATOCA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE ZAPATOCA	0	0	0	0	0	0	0%

Fuente: SIVIGILA WEB


INFOGRAFÍA GRUPOS POBLACIONALES

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 28 DE 2026


GRUPO DE EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA - SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER

POBLACIÓN GESTANTE: Nº. Casos: 856


Casos notificados en Gestantes por rango de edad



Distribución de casos en Gestantes por zona de




Casos notificados en Gestantes según Régimen de Afiliación




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	101 de 112


Condición final de casos notificados en Gestantes



Eventos de interés en salud pública notificados en Gestantes




Mun. de residencia de casos not. en gestantes




POBLACIÓN MIGRANTE: N°. Casos: 479


Pirámide poblacional



Distribución de casos en migrantes por zona de residencia



Casos notificados en Migrantes según Régimen de Afiliación




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	103 de 112

POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD: Nº. Casos: 288


Pirámide poblacional




Distribución de casos en PPL por zona de residencia




Casos notificados en PPL según Régimen de Afiliación




Condición final de casos notificados en PPL



Eventos de interés en salud pública notificados en PPL




Reclusorios que notificaron casos en PPL



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	104 de 112

POBLACIÓN CON PERTENENCIA ÉTNICA: N°. Casos: 116




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	105 de 112

POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD: N°. Casos: 97


Pirámide poblacional




Distribución de casos en Población en condición de discapacidad por zona de residencia




Casos notificados en Población en condición de discapacidad según Régimen de Afiliación



Condición final de casos notificados en Población en condición de discapacidad



Eventos de interés en salud pública notificados en Población en condición de discapacidad



Mun. de residencia de casos not. en Pob. en cond. de discapacidad




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	106 de 112

POBLACIÓN VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO: Nº. Casos: 27


Pirámide poblacional




Distribución de casos en Población víctima de violencia armada por zona de residencia




Casos notificados en Población víctima de violencia armada según Régimen de Afiliación



Condición final de casos notificados en Población víctima de violencia armada



Eventos de interés en salud pública notificados en Población víctima de violencia armada



Mun. de residencia de casos not. en Pob. víc. de violencia armada




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	107 de 112

POBLACIÓN EN CENTROS PSIQUIÁTRICOS: N°. Casos: 213


Pirámide poblacional




Distribución de casos en Población en centros psiquiátricos por zona de residencia




Casos notificados en Población en centros psiquiátricos



Condición final de casos notificados en Población en centros psiquiátricos



Eventos de interés en salud pública notificados en Población en centros psiquiátricos



Mun. de residencia de casos not. en Pob. en centros psiquiátricos




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	108 de 112

POBLACIÓN HABITANTES DE LA CALLE: Nº. Casos: 72


Pirámide poblacional




Distribución de casos en Población habitantes de la calle por zona de residencia




Casos notificados en Población habitantes de la calle



Condición final de casos notificados en Población habitantes de la calle



Eventos de interés en salud pública notificados en Población habitantes de la calle



Mun. de residencia de casos not. en Población habitantes de la calle




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	109 de 112

POBLACIÓN INFANTIL A CARGO DEL ICBF: N°. Casos: 51


Pirámide poblacional




Distribución de casos en Población infantil a cargo del ICBF por zona de residencia




Casos notificados en Población infantil a cargo del ICBF según Régimen de Afiliación



Condición final de casos notificados en Población infantil a cargo del ICBF



Eventos de interés en salud pública notificados en Población infantil a cargo del ICBF



Mun. de residencia de casos not. en Población infantil a cargo del ICBF




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL


CÓDIGO	MI-GS-RG-537
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
PÁGINA	110 de 112

POBLACIÓN DESPLAZADOS: Nº. Casos: 33


Pirámide poblacional




Distribución de casos en Población desplazada por zona de residencia




Casos notificados en población desplazada según Régimen de Afiliación



Condición final de casos notificados en Población desplazada



Eventos de interés en salud pública notificados en Población desplazada



Mun. de residencia de casos not. en Población desplazada



	BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL	CÓDIGO	MI-GS-RG-537
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
		PÁGINA	111 de 112

FICHA TÉCNICA

Con base en la información reportada al Sistema de vigilancia - SIVIGILA, con corte a la semana epidemiológica 28 de 2026, se realizó un análisis descriptivo de los casos notificados en la variable “grupo poblacional”. El objetivo de este análisis es caracterizar el contexto demográfico de los casos, considerando su distribución por edad, sexo, zona de residencia (cabecera municipal, centro poblado y rural disperso), régimen de afiliación al sistema de salud y condición final (vivo o fallecido). Asimismo, se incluyen los eventos de interés en salud pública y la distribución de los casos según el municipio de residencia de las personas notificadas.

	BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL	CÓDIGO	MI-GS-RG-537
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	04/11/2021
		PÁGINA	112 de 112

Boletín Epidemiológico 28
Secretaría de Salud de Santander

Alexander Torres Prieto

Coordinador Grupo Epidemiología y demografía

Diana Patricia Ariza Díaz

Profesional universitaria, Grupo Epidemiología y demografía

Referentes de los eventos

Duby Marlene Quiñonez

Xiomara Chanagá Vera

Juliana Monsalve Sarmiento

Fabiola Andrea Mayorga

Daynner Vacca Lascarro

Lilibeth López Moreno

Karent Duran Rondón

Leonardo Silva Rueda

Sonia Luz Gómez Garcés

Mayra Alejandra Contreras

Paola Suarez Suarez

Olga Liced Jiménez

Leonor Eloisa Araujo Arias

Lady Yohana Mateus

Consolidó:

Karent Yohary Duran Rondón

Publicación: Grupo de Epidemiología y Demografía SSS