

"VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN



El sarampión es

la enfermedad más contagiosa que existe en el mundo.

Un caso puede contagiar a 18 personas no vacunadas.

La vacuna es muy efectiva y nos protege.

#LASVACUNASSON GRATISYSEGURAS



Salud



GOBERNACIÓN DE **SANTANDER**

SECRETARÍA DE **SALUD**

PAI PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES



¿Cómo se contagia?



- Se transmite por gotas de saliva de una persona infectada cuando habla, tose o estornuda.
- El virus puede permanecer en el aire y en las superficies hasta por 2 horas.
- Una persona con sarampión puede contagiar entre 12 a 18 personas



Salud



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER





SECRETARÍA DE
—SALUD—

PAI PROGRAMA
AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES



Reconoce los síntomas del sarampión

Los síntomas pueden aparecer entre 7 y 21 días después del contacto con la persona infectada e incluyen:

-  Fiebre alta
-  Rinorrea (moqueo nasal)
-  Conjuntivitis
-  Erupción en la piel que inicia en la cara, cuello, orejas y se extiende al resto del cuerpo

Si presentas alguno de estos síntomas o conoces a alguien que los tenga, **consulta de inmediato a tu IPS o informa a la Secretaría de Salud de tu municipio.**



Salud



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER

SECRETARÍA DE
SALUD

PAI PROGRAMA
AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES



¿Cómo prevenir el sarampión



Vacunarse: La mejor manera de protegerse es recibir las vacunas en las edades indicadas.



Quedarse en casa si se está enfermo: No ir a la escuela, al trabajo, al parque ni a otros lugares donde pueda haber riesgo de contagiar a otras personas.



Usar tapabocas: Si se está enfermo, cubrir nariz y boca con un tapabocas.




Lavar las manos con agua y jabón: Hacerlo después de usar el baño, antes de comer y después de tocar objetos sucios.



Cubrirse al toser o estornudar: Usar un pañuelo desechable o cubrirse con el antebrazo.



Reconocer cuándo buscar ayuda médica: Identificar señales de alarma en la salud.



La vacunación es la forma más efectiva de prevenir el sarampión.



Salud



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER

SECRETARÍA DE
SALUD

PAI PROGRAMA
AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES



La vacunación es la herramienta para enfrentar el sarampión




Viajeros sin antecedente vacunal verificable: deben recibir una dosis mínimo 15 días antes del viaje.



Trabajadores de instituciones de salud: las IPS deben verificar el antecedente vacunal de todo su personal; quienes no cuenten con soporte físico o digital deben recibir la dosis adicional.



Contactos de casos sospechosos de sarampión con antecedente vacunal incierto.



**#LASVACUNASSON
GRATISYSEGURAS**



Salud



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER

SECRETARÍA DE
SALUD

PAI PROGRAMA
AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES



Vacúnate y protege a tu comunidad

- Recuerda que la vacuna triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y paperas y la vacuna bivalente protege contra el sarampión – rubéola (SR) las cuales son seguras y gratuitas.
- Vacúnate antes de viajar. El sarampión circula en muchos lugares del mundo.

Revisa el carné de vacunación de tus hijos. Si falta una dosis, acude al punto de vacunación más cercano.



#LASVACUNASSON GRATISYSEGURAS



Salud



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER

SECRETARÍA DE
SALUD

PAI PROGRAMA
AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES



Guía operativa para la vacunación contra Sarampión Rubeola 2026

1. TALENTO HUMANO EN SALUD

Población	Antecedente	Vacuna / acción indicada	Observaciones técnicas
De 18 años y más	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión o con anticuerpos IgG positivos para sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis o con resultado seronegativo IgG	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica

2. VIAJEROS INTERNACIONALES (Vacunar mínimo 15 días antes del viaje)

Población	Antecedente	Vacuna / acción indicada	Observaciones técnicas
De 6-11 meses en municipios priorizados	1 dosis SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis	Aplicar 'Dosis Cero' con SRP	La "Dosis Cero", NO reemplaza dosis del esquema de 12 meses
De 12-17 meses que viajan a países de riesgo (Canadá, México o Estados Unidos)	2 Dosis SRP/SR	No vacunar	
	1 dosis SRP	Aplicar 1 dosis adicional SRP cuatro semanas después de la primera.	La dosis adicional no reemplaza dosis del esquema de 18 meses.
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	La dosis adicional no reemplaza dosis del esquema de 18 meses.
De 18 meses a 10 años	2 dosis SRP	No vacunar	No Aplica
	1 dosis SRP	Aplicar 1 dosis de SRP	No Aplica
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
	1 dosis de SR	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
De 11-16 años	2 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	1 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
De 17-59 años	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
De 60 años y más	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica



Salud



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER

SECRETARÍA DE
SALUD



3. CIERRE DE BRECHAS-BARRIDOS DOCUMENTALES			
Población	Antecedente	Vacuna / acción indicada	Observaciones técnicas
De 6-11 meses en municipios priorizados	1 dosis SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis	Aplicar 'Dosis Cero' con SRP	La "Dosis Cero", NO reemplaza dosis del esquema de 12 meses
De 12-17 meses	2 Dosis SRP/SR	No vacunar	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
	1 dosis SRP	Aplicar 1 dosis SRP de acuerdo con el esquema de vacunación	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
De 18 meses a 10 años	2 dosis SRP	No vacunar	No Aplica
	1 dosis SRP	Aplicar la 2 dosis de SRP	No Aplica
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
	1 dosis de SR	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
De 11-16 años	2 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	1 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
4. BLOQUEO ANTE CASO SOSPECHOSO			
Población	Antecedente	Vacuna / acción indicada	Observaciones técnicas
De 6-11 meses	1 dosis SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis SRP o SR	Aplicar 'Dosis Cero' SRP y continuar esquema de vacunación	La "Dosis Cero", NO reemplaza dosis del esquema de 12 meses.
De 12-17 meses	2 Dosis SRP/SR	Aplicar 1 dosis adicional SRP	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
	1 dosis SRP	Aplicar 1 dosis SRP adicional	No reemplaza dosis del esquema de 18 meses.
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de adicional SRP	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
De 18 meses a 10 años	2 dosis SRP	Aplicar 1 dosis con SRP	No Aplica
	1 dosis SRP	Aplicar la 2 dosis de SRP	No Aplica
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
	1 dosis de SR	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
De 11-16 años	2 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	1 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
De 17 años a 59 años	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
De 60 años y más	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
Nota: Toda persona que demuestre prueba de anticuerpo (IgG) contra Sarampión y Rubéola positiva, no requieren vacunación y debe ser registrada en PAIWEB.			
Nota: En todos los casos se deben contemplar las contraindicaciones y precauciones descritas en los insertos de las vacunas, para realizar el proceso de vacunación.			



Salud




GOBERNACIÓN DE SANTANDER

SECRETARÍA DE SALUD



148 PUNTOS DE VACUNACIÓN DISPONIBLES EN TODO EL DEPARTAMENTO SANTANDER



ESCANEA EL CÓDIGO QR



Salud



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER

SECRETARÍA DE
SALUD

PAI PROGRAMA
AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES

