

# “VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN



**El sarampión es**

la enfermedad más contagiosa que existe en el mundo.

Un caso puede contagiar a 18 personas no vacunadas.

La vacuna es muy efectiva y nos protege.

**#LASVACUNASSON GRATIS Y SEGURAS**



Salud



GOBERNACIÓN DE **SANTANDER**

SECRETARÍA DE **SALUD**

**PAI** PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES



# ¿Cómo se contagia?



- Se transmite por gotas de saliva de una persona infectada cuando habla, tose o estornuda.
- El virus puede permanecer en el aire y en las superficies hasta por 2 horas.
- Una persona con sarampión puede contagiar entre 12 a 18 personas



Salud



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**





SECRETARÍA DE  
**SALUD**

**PAI** PROGRAMA  
AMPLIADO DE  
INMUNIZACIONES



# Reconoce los síntomas del sarampión

Los síntomas pueden aparecer entre 7 y 21 días después del contacto con la persona infectada e incluyen:

-  Fiebre alta
-  Rinorrea (moqueo nasal)
-  Conjuntivitis
-  Erupción en la piel que inicia en la cara, cuello, orejas y se extiende al resto del cuerpo

Si presentas alguno de estos síntomas o conoces a alguien que los tenga, **consulta de inmediato a tu IPS o informa a la Secretaría de Salud de tu municipio.**



Salud



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**

SECRETARÍA DE  
**SALUD**

**PAI** PROGRAMA  
AMPLIADO DE  
INMUNIZACIONES



# ¿Cómo prevenir el sarampión



**Vacunarse:** La mejor manera de protegerse es recibir las vacunas en las edades indicadas.



**Quedarse en casa si se está enfermo:** No ir a la escuela, al trabajo, al parque ni a otros lugares donde pueda haber riesgo de contagiar a otras personas.



**Usar tapabocas:** Si se está enfermo, cubrir nariz y boca con un tapabocas.




**Lavar las manos con agua y jabón:** Hacerlo después de usar el baño, antes de comer y después de tocar objetos sucios.



**Cubrirse al toser o estornudar:** Usar un pañuelo desechable o cubrirse con el antebrazo.



**Reconocer cuándo buscar ayuda médica:** Identificar señales de alarma en la salud.



**La vacunación es la forma más efectiva de prevenir el sarampión.**



Salud



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**

SECRETARÍA DE  
**SALUD**

**PAI** PROGRAMA  
AMPLIADO DE  
INMUNIZACIONES



# La vacunación es la herramienta para enfrentar el sarampión




Viajeros sin antecedente vacunal verificable: deben recibir una dosis mínimo 15 días antes del viaje.



Trabajadores de instituciones de salud: las IPS deben verificar el antecedente vacunal de todo su personal; quienes no cuenten con soporte físico o digital deben recibir la dosis adicional.



Contactos de casos sospechosos de sarampión con antecedente vacunal incierto.



**#LASVACUNASSON  
GRATISYSEGURAS**



Salud



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**

SECRETARÍA DE  
**SALUD**

**PAI** PROGRAMA  
AMPLIADO DE  
INMUNIZACIONES



# Vacúnate y protege a tu comunidad

- Recuerda que la vacuna triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y paperas y la vacuna bivalente protege contra el sarampión – rubéola (SR) las cuales son seguras y gratuitas.
- Vacúnate antes de viajar. El sarampión circula en muchos lugares del mundo.

**Revisa el carné de vacunación de tus hijos. Si falta una dosis, acude al punto de vacunación más cercano.**



**#LASVACUNASSON GRATISYSEGURAS**



Salud



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**

SECRETARÍA DE  
**SALUD**

**PAI** PROGRAMA  
AMPLIADO DE  
INMUNIZACIONES



# Guía operativa para la vacunación contra Sarampión Rubeola 2026

1. TALENTO HUMANO EN SALUD			
Población	Antecedente	Vacuna / acción indicada	Observaciones técnicas
De 18 años y más	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión o con anticuerpos IgG positivos para sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis o con resultado seronegativo IgG	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
2. VIAJEROS INTERNACIONALES (Vacunar mínimo 15 días antes del viaje)			
Población	Antecedente	Vacuna / acción indicada	Observaciones técnicas
De 6–11 meses en municipios priorizados	1 dosis SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis	Aplicar 'Dosis Cero' con SRP	La "Dosis Cero", NO reemplaza dosis del esquema de 12 meses
De 12–17 meses que viajan a países de riesgo (Canadá, México o Estados Unidos)	2 Dosis SRP/SR	No vacunar	
	1 dosis SRP	Aplicar 1 dosis adicional SRP cuatro semanas después de la primera.	La dosis adicional no reemplaza dosis del esquema de 18 meses.
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	La dosis adicional no reemplaza dosis del esquema de 18 meses.
De 18 meses a 10 años	2 dosis SRP	No vacunar	No Aplica
	1 dosis SRP	Aplicar 1 dosis de SRP	No Aplica
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
	1 dosis de SR	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
De 11–16 años	2 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	1 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
De 17–59 años	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
De 60 años y más	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica



Salud



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**

SECRETARÍA DE  
**SALUD**

PAI  
PROGRAMA  
AMPLIADO DE  
INMUNIZACIONES



3. CIERRE DE BRECHAS-BARRIDOS DOCUMENTALES			
Población	Antecedente	Vacuna / acción indicada	Observaciones técnicas
De 6-11 meses en municipios priorizados	1 dosis SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis	Aplicar 'Dosis Cero' con SRP	La "Dosis Cero", NO reemplaza dosis del esquema de 12 meses
De 12-17 meses	2 Dosis SRP/SR	No vacunar	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
	1 dosis SRP	Aplicar 1 dosis SRP de acuerdo con el esquema de vacunación	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
De 18 meses a 10 años	2 dosis SRP	No vacunar	No Aplica
	1 dosis SRP	Aplicar la 2 dosis de SRP	No Aplica
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
	1 dosis de SR	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
De 11-16 años	2 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	1 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
4. BLOQUEO ANTE CASO SOSPECHOSO			
Población	Antecedente	Vacuna / acción indicada	Observaciones técnicas
De 6-11 meses	1 dosis SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	No vacunar	No Aplica
	0 dosis SRP o SR	Aplicar 'Dosis Cero' SRP y continuar esquema de vacunación	La "Dosis Cero", NO reemplaza dosis del esquema de 12 meses.
De 12-17 meses	2 Dosis SRP/SR	Aplicar 1 dosis adicional SRP	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
	1 dosis SRP	Aplicar 1 dosis SRP adicional	No reemplaza dosis del esquema de 18 meses.
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de adicional SRP	Complete esquema cuando cumpla 18 meses
De 18 meses a 10 años	2 dosis SRP	Aplicar 1 dosis con SRP	No Aplica
	1 dosis SRP	Aplicar la 2 dosis de SRP	No Aplica
	0 dosis SRP	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
	1 dosis de SR	Iniciar 1 dosis de SRP y aplicar segunda dosis a las cuatro semanas.	No Aplica
De 11-16 años	2 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	1 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
De 17 años a 59 años	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
De 60 años y más	1 dosis de SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
	0 dosis con SRP, SR o cualquier otra vacuna que contenga el antígeno contra el sarampión	Aplicar 1 dosis con SR	No Aplica
<b>Nota:</b> Toda persona que demuestre prueba de anticuerpo (IgG) contra Sarampión y Rubéola positiva, no requieren vacunación y debe ser registrada en PAIWEB.			
<b>Nota:</b> En todos los casos se deben contemplar las contraindicaciones y precauciones descritas en los insertos de las vacunas, para realizar el proceso de vacunación.			



Salud




GOBERNACIÓN DE SANTANDER

SECRETARÍA DE SALUD



# 204 PUNTOS DE VACUNACIÓN DISPONIBLES EN TODO EL DEPARTAMENTO SANTANDER



ESCANEA EL CÓDIGO QR



Salud



GOBERNACIÓN DE  
**SANTANDER**

SECRETARÍA DE  
**SALUD**

**PAI** PROGRAMA  
AMPLIADO DE  
INMUNIZACIONES

